HUMAN MONOCLONAL ANTIBODY

Publication number: JP2002543822 (T)

Publication date: 2002-12-24

Inventor(s): Applicant(s): Classification:

- international: G01N33/53; A61K39/395; A61P11/00; A61P31/14;

C07K16/10; C12N1/15; C12N1/19; C12N1/21; C12N5/10; C12N15/09; C12P21/08; G01N33/569; G01N33/577; G01N33/53; A61K39/395; A61P11/00; A61P31/00;

C07K16/08; C12N1/15; C12N1/19; C12N1/21; C12N5/10; C12N15/09; C12P21/08; G01N33/569; G01N33/577; (IPC1-7): C12N15/09; A61K39/395; A61P11/00; A61P31/14; C07K16/10; C12N1/15; C12N1/19; C12N1/21; C12N5/10;

C12P21/08; G01N33/53; G01N33/569; G01N33/577

- European: C07K16/10F; G01N33/569K Application number: JP20000617922T 20000518

Priority number(s): US19990134702P 19990518; WO2000US13694 20000518

Abstract not available for JP 2002543822 (T)

Abstract of corresponding document: WO 0069462 (A1)

This invention relates to novel human monoclonal antibodies (mAbs) and to the genes encoding same. More specifically, this invention relates to human monoclonal antibodies specifically reactive with an epitope of the fusion (F) protein of Respiratory Syncytial Virus (RSV). Such antibodies are useful for the therapeutic and/or prophylactic treatment of RSV infection in human patients, particularly infants and young children.

Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

Also published as:

WO0069462 (A1)

P1178829 (A1)

EP1178829 (A4)

AU5441000 (A)

AR030019 (A1)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2002-543822 (P2002-543822A)

(43)公表日 平成14年12月24日(2002.12.24)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ			テ-	-マコード(参考)
C 1 2 N	15/09	ZNA		A 6 1 K	39/395		M	4 B 0 2 4
A 6 1 K	39/395						S	4 B 0 6 4
				A 6 1 P	11/00			4B065
A 6 1 P	11/00				31/14			4 C 0 8 5
	31/14			C 0 7 K	16/10			4H045
			審査請求	未請求 予何	備審査請求	有 (全 92	頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願2000-617922(P2000-617922) (86) (22)出願日 平成12年5月18日(2000.5.18) (85)翻訳文提出日 平成13年11月16日(2001.11.16) (86)国際出願番号 PCT/US00/13694 (87) 国際公開番号 WO00/69462 (87)国際公開日 平成12年11月23日(2000.11.23) (31)優先権主張番号 60/134,702 (32)優先日 平成11年5月18日(1999.5.18) (33)優先権主張国 米国(US)

(71)出願人 スミスクライン・ビーチャム・コーポレイション

SMITHKLINE BEECHAM

CORPORATION

アメリカ合衆国ペンシルベニア州19406-0939、キング・オブ・プルシア、スウェー

ドランド・ロード709番

(72)発明者 ミッチェル・エス・グロス

アメリカ合衆国19087ペンシルベニア州ウ

ェイン、ピュー・ロード667番

(74)代理人 弁理士 青山 葆 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ヒトモノクローナル抗体

(57) 【要約】

本発明は、新規なヒトモノクローナル抗体(mAb)および該モノクローナル抗体をコードしている遺伝子に関する。より詳細には、本発明は、RSウイルス(RSV)の融合(F)蛋白質のエピトープと特異的に反応するヒトモノクローナル抗体に関する。かかる抗体は、ヒト患者、特に幼児および幼い小さい子供におけるRSV感染の治療的および/または予防的処理に有用である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 RSウイルスのF蛋白質エピトープと特異的に反応し、 $G\lambda$ -1 Aおよび $G\lambda$ -1 Bよりなる群から選択される該ウイルスによる感染を中和できるヒトモノクローナル抗体およびその機能的フラグメント。

【請求項2】 図3 配列番号2のL鎖アミノ酸配列および図4 配列番号4のH鎖アミノ酸配列を含む請求項1記載のモノクローナル抗体。

【請求項3】 図11 配列番号16によってコードされるL鎖アミノ酸配列および図10A-10B 配列番号15のDNA配列によってコードされるH鎖アミノ酸配列を含む請求項1記載のモノクローナル抗体。

【請求項4】 フラグメントがFv、Fabおよび $F(ab')_2$ よりなる 群から選択される請求項1記載のモノクローナル抗体。

【請求項5】 (a) 請求項 $1\sim 4$ のいずれか1項記載のヒトモノクローナル抗体、改変抗体およびCDRのいずれかをコードしている核酸配列:

- (b) (a) におけるいずれかの配列に相補的な核酸;および
- (c) ストリンジェントな条件下で請求項 $1\sim4$ のいずれか1項記載のCDRにハイブリダイズできる18以上のヌクレオチドの核酸配列よりなる群から選択される単離核酸分子。

【請求項6】 図8A-8Fおよび9A-9E 配列番号13および14、または図10A-10Bおよび11 配列番号15および16の配列を含む請求項5記載の単離核酸分子。

【請求項7】 請求項5または6のいずれか1項記載の核酸配列を含む組換えプラスミド。

【請求項8】 請求項7記載のプラスミドを含む宿主細胞。

【請求項9】 請求項8記載の宿主細胞を適当な温度およびpH条件下で培地中において培養し、そのように生産された抗体を回収することを特徴とするRSVに特異的なヒト抗体の生産法。

【請求項10】 RSVを含有する疑いのある供給源を診断上有効量の請求項1記載のモノクローナル抗体と接触させ、モノクローナル抗体が該供給源に結合するか否かを決定することを特徴とするRSVの検出法。

【請求項11】 ヒトに免疫治療上有効量の請求項1記載のモノクローナル 抗体を投与することを特徴とする、ヒトにおけるRSV疾患に受動免疫治療を提 供する方法。

【請求項12】 受動免疫治療が予防的に提供される請求項11記載の方法

【請求項13】 医薬上許容される担体中における免疫治療上有効量の請求項1記載のモノクローナル抗体の少なくとも1投与量を含んでなる医薬組成物。

【請求項14】 免疫治療上有効量の請求項1記載のモノクローナル抗体の少なくとも1投与量を少なくとも1つの付加的なモノクローナル抗体と組み合わせて含んでなる医薬組成物。

【請求項15】 付加的なモノクローナル抗体がRSV F蛋白質抗原の異なるエピトープと反応性であることによって請求項1記載の抗体と区別される抗-RSV抗体である請求項14記載の医薬組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

(技術分野)

本発明は、新規なヒトモノクローナル抗体(mAb)および該モノクローナル 抗体をコードしている遺伝子に関する。より詳細には、本発明は、RSウイルス (Respiratory Syncytial Virus) (RSV)の融合(F)蛋白質のエピトープ と特異的に反応するヒトモノクローナル抗体に関する。かかる抗体は、ヒト患者 、特に幼児および幼い子供におけるRSV感染の治療的および/または予防的処 理に有用である。

[0002]

(背景技術)

RSウイルス(RSV)は、子供における下部呼吸性疾患の主要な原因であり、世界中の子供において細気管支炎および肺炎の予測可能な例年の流行をもたらす。該ウイルスは感染性が高く、いずれの年齢でも感染が起きる可能性がある。RSV感染およびその臨床的特徴に関する包括的な詳細は、"Respiratory Syncy tial Virus", Ch. 38, B.N. Fields ed., Raven Press (1990)においてMcIntosh, K.およびR. M. Chanock、および"Textbook of Pediatric Disease" Feigin and Cherry, eds., W.B. Saunders, pgs 1247-1268 (1987)において Hall, C.B.による優れた近年の報告から得ることができる。

[0003]

RSVは世界中に分布している。RSVウイルスの疫学の最も顕著な特徴の一つは、上記のように、感染および疾患の一貫したパターンである。他の呼吸性ウイルスは、不規則な間隔で流行病を引き起こすか、または混成した流行病/流行病パターンを示すが、RSVは、大都市中心において毎年かなり大きな流行をもたらす唯一の呼吸性ウイルス病原体である。世界の温帯地域において、RSV流行病は、晩秋、冬または春に主に起こるが、夏には決して起こらない。コミュニティー内での感染の発生および蔓延は特徴的であり、容易に診断され、細気管支炎および小児肺炎ならびに急性下気道疾患を有する幼い子供の入院数においてシャープな上昇をもたらす。大発生が起こる他の呼吸性ウイルス物質は、RSVと

同時期にめったに存在しない。

[0004]

一次RSV感染は非常に幼年において起こる。 $0\sim2$ 才の幼児が最も罹患しやすく、一次罹患集団を代表する。該群において、5 人のうち1 人が感染において下部呼吸(咽頭下)疾患を発病し、この比率は再感染において同様である。自然感染の結果として、1 歳までに25-50%の幼児が特異的抗体を有し、これは4-5 歳までに100%に近付く。したがって、実際、就学前に全ての子供が感染する。

[0005]

年齢、性別、社会経済および環境的要因は全て、疾患の重篤度に影響を及ぼしうる。RSV感染ケースの1-3%において入院が必要となり、通常、長期間(3週間まで)である。RSV感染の特に幼年期における高い罹患率は、また、後年、呼吸性の問題の発生に関係する。米国および他の先進国における現行の集中治療によると、正常対象に関する全死亡率は低い(入院対象の2%未満)。しかしながら、あまり発展していない国における死亡率は非常に高く、また、先進国においてでも、心臓病(チアノーゼ性先天的心臓病)または呼吸性疾患(気管支肺形成異常症)下にある幼児におけるようなある特定の危険性のある群において死亡率が高い。例えば、チアノーゼ性先天的心臓病の幼児における死亡率は37%ほどの高さであると報告されている。未熟な幼児において、RSV感染のために無呼吸期間が起こり、稀な場合、神経学的または全身性損傷を引き起こしうる。重篤な下気道疾患(細気管支炎および肺炎)は、6ヶ月以下の患者において最も一般的である。該疾患から見たところ完全に回復したらしい幼児は、何年もの間、呼吸性異常の徴候(頻発する喘鳴、肺機能の低下、頻発する咳、喘息および気管支炎)を示しうる。

[0006]

RSVに対する免疫は短命であるらしく、したがって再感染が頻発する。免疫系がRSV感染および再感染を保護する機構はよく理解されていない。しかしながら、再感染が全ての年齢においてよく起こり、時々、幼児において一次感染から回復したほんの数週間後に起こるので、免疫が部分的にだけ保護するというこ

とは明らかである。成人ならびに非常に小さい幼児においてRSV感染に応答して、血清および分泌抗体(IgA)の両方が検出された。しかしながら、ウイルス性FまたはG糖蛋白質に対する血清抗体、ならびに幼児(1-8 $_{\rm F}$ 月)に見られる中和抗体の力価は、より高齢の対象において見られる力価の1 5-2 5%である。これらの低い力価は、より幼い子供における重篤な感染の発生率の増加に寄与しうる。

[0007]

RSVウイルスに対する保護における血清抗体の役割の証拠は、疫学的ならびに動物研究から明らかになった。該ウイルスに自然に曝露される成人において、感染性は低血清抗体レベルとよく相関した。幼児において、母性伝播した抗体の力価は重篤な疾患に対する耐性と相関する(Glezen, W.P.ら、J. Pediatr. 98:708-715(1981))。他の研究は、下気道疾患の発生率および重篤度が高い血清抗体の存在において減少すること(McIntosh, K.ら、J. Infect. Dis. 138:24-32(1978))および受動的に投与された血清中和抗体の高い力価がRSV感染のコトンラットモデルにおいて保護的であることを示したこと(Prince, G.A.ら、Virus Res. 3:193-206(1985))を示す。

[0008]

細胞性免疫を欠く子供は、正常な免疫系を有する子供とは対照的に、感染を抑えることができず、何ヶ月もの間ウイルスを有する。同様に、RSVウイルスで感染させたヌードマウスは、持続的にウイルスを有する。これらのマウスは、感作T細胞の養子移入によって治療できる(Cannon, M. J. ら、Immunology 62: 133-138 (1987))。

[0009]

要約すると、細胞性および体液性免疫はどちらも、感染、再感染およびRSV 疾患に対する保護に関与するようであり、抗原性変量は制限されるが、複数の曝 露後でさえ保護免疫は完全ではないようである。

[0010]

パラミオクソウイルス科 (paramyoxoviridae) に属するRSVは、パラミクソウイルス (paramyxovirus) と同様の特性を有するマイナス鎖非断片化RNAウ

イルスである。しかしながら、形態的相違ならびに赤血球凝集素およびノイラミニダーゼ活性の欠失に基づいて、別のニューモウイルス属に置かれた。RSVは、多形態性であり、直径150-300nmの大きさの範囲にある。細胞の外膜から発芽することによってウイルスは成熟し、ビリオンは短い接近して間隔を空けた突出物または「スパイク」を有する膜結合粒子として現れる。RNAゲノムは、9.5kDa~160kDaの大きさの10個の独特のウイルス性ポリペプチドをコードする(Huang,Y.T.およびG.W. Wertz,J. Virol. 43: 150-157(1982))。7つの蛋白質(F、G、N、P、L、M、M2)がRSVビリオンに存在し、少なくとも3つの蛋白質(F、GおよびSH)が感染した細胞の表面に発現する。F蛋白質に対する特異的抗体がイン・ビトロでのシンシチウム形成を阻害し、組換えF蛋白質を発現しているワクシニアウイルスに感染した細胞が他のRSVウイルス蛋白質の不在下でシンシチウムを形成するするので、F蛋白質(配列番号20)は最終的に、細胞融合の原因蛋白質として同定された。対照的に、G蛋白質に対する抗体はシンシチウム形成を阻害せずに、ウイルスの細胞に対する付着を妨げる。

[0011]

RSVは、2つの抗原性が別個のサブグループ、(A&B)に分けることができる(Mufson, M.A.ら、J. Gen'l. Virol. 66: 2111-2124 (1985))。該抗原性二形性は、主として表面付着(G)糖蛋白質に結合する(Johnson, R.A.ら、Proc. Nat'l. Acad. Sci. USA 84: 5625-5629 (1987))。AおよびB両群の系統は同時に循環するが、各集団は年々、予測不可能に変化しうる。したがって。効果的な治療は、該ウイルスの両サブグループを標的としなければならず、このため、後に議論されるように、mAb治療の標的抗原として高く保存された表面融合(F)蛋白質を選択する。

[0012]

RSVウイルスに対する中和抗体の誘導は、FおよびG表面糖蛋白質に限定されるようである。これらの2つの蛋白質のうち、F蛋白質は、RSVウイルスの異なる系統に対する保護と関連した交差反応性中和抗体の主要な標的である。さらに、マウスまたはコトンマウスのF蛋白質での実験的予防接種もまた、交差保

護をもたらす。ウイルスの系統およびサブグループを交差するF蛋白質の抗原性 の関係はアミノ酸レベルの高度な相同性において反映される。対照的に、RSV の2つのサブグループおよび種々の系統において、抗原二形性は主としてG糖蛋 白質に関連付けられる。F蛋白質は、予測分子量68-70kDa;そのN末端 にシグナルペプチド: C末端に膜アンカードメインを有し、ビリオンアセンブリ ーの前に感染細胞において蛋白質分解的に分裂してジスルフィド結合したF₂お よびF1を生じる。5つの中和エピトープがF蛋白質配列(配列番号20)内に 同定され、205-225;259-278;289-299;483-488 および417-438残基に位置決定された。F蛋白質(配列番号20)におけ る配列変化の頻度を決定するための研究は、中和エピトープの大部分がオースト ラリア、ヨーロッパおよび米国の地域において30年間にわたって単離された2 3系統のRSVウイルスの全てにおいて保存されていたことを示した。別の研究 において、サブグループAまたはサブグループB系統での一次感染に対する43 人の幼児および幼い子供の血清応答は、同種および異種F抗原に対する応答が有 意に異なるものではなく、一方、サブグループAおよびB系統のG蛋白質は全く 無関係であったことを示した。さらに、イン・ビトロでのウイルス媒介性細胞融 合の抗体阻害対感染の阻害は動物モデルにおける保護と最もよく相関し、融合阻 害は主にF蛋白質特異的抗体に限られる。

[0013]

したがって、RSV感染の予防的処理は、高い危険性のある子供の群ならびに発展途上国の全ての子供について望ましい。しかしながら、RSV感染のためのワクチンは、現在、入手できない。1960年代に試験された減弱した全ウイルスワクチンを取り囲む安全性が厳しくなり、ならびにより新しい候補サブユニットワクチンに関連した誘導される免疫病理学の可能性は、近い将来におけるワクチンの見通しが遠いことを明らかにする。今までのところ、1の薬物療法、幅広い範囲の抗ウイルス性であるリバビリン(Ribavirin)が認可された。リバビリンは、投与、穏かな毒性および疑わしい効力の問題のために最小限の容認を獲得したにすぎない。大多数の場合、入院した子供は薬物療法を受けず、非常に高価な集中的支持療法のみを受ける。RSV感染の治療のための安全で効果的かつ容

易に投与される薬物に対する要望があることは明らかである。

[0014]

ヒトにおける受動的抗体療法の使用は、よく報告されており、肝炎およびサイトメガロウイルスのような他の感染性疾患を治療するために用いられている。RSVに対する受動的抗体治療/予防の可能性は、動物モデルを用いてよく確立された。RSVを包含する感染性物質に対する動物における初期の受動的移入研究のほとんどは、ネズミmABを利用した。動物における研究は、明らかに、FおよびG糖蛋白質の両方に対するポリクローナルおよびモノクローナル抗体が予防的または治療的に与えられた場合にRSVウイルス感染において受動的保護を授与できることを証明した(Princeら、前掲)。これらの研究において、中和FまたはGmAbのマウス、コトンラットまたはサルへの受動的移入は、肺におけるRSVウイルスの複製を有意に減少するか、または完全に防止する。しかしながら、上記のように、明らかに、F蛋白質は抗体療法のより重要な標的である。

[0015]

近年、FDAは、プールしたヒト血清から単離された静脈内ガンマグロブリン (IVIG) の使用を認可した。該研究の最初の報告が奨励されてきた(Grooth uis, J.R.ら、Antimicrob. Agents Chemo. 35(7): 1469–1473 (1991))。しかしながら、IVIGの一般的な欠点が存在し、制限するものではないが、かかる生産物はヒト血液由来であり、有効投与量を達成するためには、しばしば何グラムもの抗体が投与されなければならないという事実を包含する。

[0016]

別法では、モノクローナル抗体が使用された。かかるアプローチの利点は:より高濃度の特異的抗体が達成でき、それにより投与されるべきグロブリンの量を減少できること;直接的な血液生産物への依存を排除できること;調製物中の抗体のレベルをより均一に調節できることおよび投与経路を広げることができることを包含する。異種(例えば、ネズミ)由来のモノクローナル抗体を用いる受動的免疫療法が提案されたが(PCT出願第PCT/US94/08699号、公開番号第WO95/04081号を参照のこと)、外来抗体に対して向けられた患者の一部における望ましくない免疫応答の危険性を減少させるための1の選択

肢は、「ヒト化」抗体を使用することである。これらの抗体は、実質的にヒト起源であり、非ヒト起源の相補性決定領域(CDR)だけを有する。該アプローチの特に有用な例は、PCT出願第PCT/GB91/01554号、公開番号第WO92/04381号およびPCT出願第PCT/GB93/00725号、公開番号第WO93/20210号に開示されている。幼い子供におけるRSV感染の治療のためのヒト化抗体の効力を評価するための臨床試験は進行中である

[0017]

第2およびより好ましいアプローチは、完全ヒトmAbを使用することである。不運にも、伝統的なハイブリドーマ技術によるヒトモノクローナル抗体の製造における成功例はほとんどない。実際、許容されるヒト融合パートナーは同定されておらず、ネズミミエローマ融合パートナーはヒト細胞とよく作動せず、不安定で低生産量のハイブリドーマ系統を生じる。しかしながら、分子生物学および免疫学における近年の進歩がこの度、ヒトmAB、特に外来感染性物質に向けられたヒトmABを単離することを可能にした。

[0018]

RSV F蛋白質 (配列番号20) に対する完全ヒトmAbは、該疾患の治療に望ましい選択を残している。かかるmAbのフラグメントの取得におけるいくつかの成功例が報告されたが (Barnbas, C.F. ら、Proc. Nat'l. Acad. Sci. USA 89: 10164-10168 (1992); Crowe, J.E. ら、Proc. Nat'l. Acad. Sci. USA 91: 1386-1390 (1994)および1994年3月31日に公開番号第WO94/06448号として公開されたPCT出願第PCT/US93/08786号)、かかる結果の達成は容易ではない。しかしながら得られた新規なヒトmABは、単独または免疫治療組成物を形成するための既存の分子と組み合わせて特に有用である

当該分野において、RSVの予防または受動的治療に有用な予防的組成物に対する要望が存在する。

[0019]

(発明の開示)

発明の簡単な記載

1の態様において、本発明は、RSVのF蛋白質エピトープと特異的に反応し、RSV感染を中和できる完全ヒトモノクローナル抗体およびその機能的フラグメントを提供する。RSVウイルスのF蛋白質に特異的なこれらのヒトmABは、感染を受動的に治療または予防するのに有用でありうる。

[0020]

もう1つ別の態様において、本発明は、ヒト抗体配列のランダムコンビナトリアルクローニングによって生産され、繊維状ファージFabディスプレーライブラリーから単離されるRSVのF蛋白質に特異的な中和一本鎖Fvフラグメント(scFV)に修飾を提供する。

またもう1つ別の態様において、第1のヒトドナー由来のヒトHおよびL鎖不変領域および第2のヒトドナーから由来のRSVのF蛋白質に対するヒト中和モノクローナル抗体由来のHおよびL鎖可変領域またはそのCDRを含有する新形態(reshaped)または改変抗体が提供される。

[0021]

さらにもう1つ別の態様において、本発明は、1 (またはそれ以上) の改変または新形態抗体および医薬上許容される担体を含有する医薬組成物を提供する。

さらにもう1つ別の態様において、本発明は、少なくとも1投与量の免疫治療上有効量の本発明の新形態、改変またはモノクローナル抗体を少なくとも1つの付加的なモノクローナル、改変または新形態抗体と組み合わせて含んでなる医薬組成物を提供する。付加的な抗体が、本発明の対象抗体とは異なるRSV F蛋白質抗原のエピトープと反応することによって本発明の対象抗体と区別される抗ーRSV抗体である特定の具体例が提供される。

[0022]

さらなる態様において、本発明は、RSV感染の予防的または治療的処理に有効な量の本発明の医薬組成物をヒトに投与することによる、ヒトにおけるRSV疾患の受動的免疫療法の方法を提供する。

さらにもう1つ別の態様において、本発明は、RSVのF蛋白質に対するヒト中和モノクローナル抗体(mAb)から由来のヒトおよび改変抗体(例えば、操

作された(engineered)抗体、CDR、FabまたはF(ab)。フラグメント、またはその類似体)の組換え生産の方法および該組換え生産に有用な成分を提供する。これらの成分は、該抗体をコードしている単離核酸配列、組換えプラスミドでトランスフェクトされる宿主細胞(好ましくは哺乳動物細胞)におけるその発現を指示することのできる選択された調節配列の制御下で核酸配列を含有する組換えプラスミドを包含する。生産方法は、本発明のトランスフェクト宿主細胞系統をヒトまたは改変抗体が該細胞中で発現するような条件下で培養し、それから発現した生産物を単離することを含む。

[0023]

本発明のまた別の態様において、生物学的流体の試料を本発明のヒト抗体および改変抗体およびそのフラグメントと接触させ、該ヒト抗体(または改変抗体、またはそのフラグメント)とRSVとの間の結合の出現についてアッセイすることを特徴とする、ヒトにおいてRSVの存在を診断する方法である。

本発明の他の態様および利益は、詳細な記載およびその好ましい具体例においてさらに記載される。

[0024]

発明の詳細な記載

本発明は、RSVのF蛋白質と反応する有用なヒトモノクローナル抗体(およびそのフラグメント)、該抗体をコードしている単離核酸およびそれらの組換え 生産のための種々の方法ならびにかかる抗体およびそのフラグメントの治療的、 予防的および診断的使用を提供する。

[0025]

I. 定義

本明細書および請求の範囲で使用される場合、下記の用語は次のように定義付されている。

「改変抗体」なる語は、改変された免疫グロブリンコーディング領域によって コードされる蛋白質であって、選択された宿主細胞中における発現によって得ら れうる蛋白質をいう。かかる改変抗体は、免疫グロブリン不変領域の全てまたは 一部を欠く操作された抗体(例えば、キメラ、ヒト化、または新形態もしくは免 疫学的にエディットされたヒト抗体)またはそのフラグメント、例えば、Fv、Fabまたは $F(ab^2)$ 。などである。

[0026]

「改変された免疫グロブリンコーディング領域」なる語は、本発明の改変抗体 またはそのフラグメントをコードしている核酸配列をいう。

「新形態ヒト抗体」なる語は、第1のヒトモノクローナルドナー抗体由来の最少で少なくとも1つのCDRが第2のヒトアクセプター抗体中のCDRの代わりに用いられている改変抗体をいう。好ましくは、6個のCDR全てが置換されている。より好ましくは、第1のヒトドナーモノクローナル抗体由来の全抗原結合領域(例えば、Fv、FabまたはF(ab')₂)が第2のヒトアクセプターモノクローナル抗体中の対応する領域の代わりに用いられている。最も好ましくは、第1のヒトドナー由来のFab領域が第2のヒトアクセプター抗体の適当な不変領域に作動可能に連結して、全長モノクローナル抗体を形成する。

[0027]

「第1の免疫グロブリンパートナー」なる語は、天然(または天然で生じる) CDR-エンコーディング領域がドナーヒト抗体のCDR-エンコーディング領域によって置換されているヒト枠組み構造またはヒト免疫グロブリン可変領域をコードしている核酸配列をいう。ヒト可変領域は、免疫グロブリンH鎖、L鎖(または両方の鎖)、その類似体または機能的フラグメントであることができる。抗体(免疫グロブリン)の可変領域内に位置するかかるCDR領域は、当該分野で既知の方法によって決定できる。例えば、Kabatら(Sequence of proteins of Immunological Interest, 第4版、U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health (1987))は、CDRを位置決定するための規則を開示する。さらに、CDR領域/構造を同定するのに有用なコンピュータープログラムが知られている。

[0028]

「第2の融合パートナー」なる語は、それに対して第1の免疫グロブリンパートナーがフレーム内でまたは任意の慣用的なリンカー配列の手段によって融合される(すなわち、作動可能に連結された)蛋白質またはペプチドをコードしてい

るもう1つ別のヌクレオチド配列をいう。好ましくは、融合パートナーは、免疫グロブリン遺伝子であり、そのような場合、「第2の免疫グロブリンパートナー」という。第2の免疫グロブリンパートナーは、同じ(すなわち、同種-第1および第2の改変抗体が同じ供給源由来である)または付加的な(すなわち、異種の)目的の抗体の全不変領域をコードしている核酸配列を包含しうる。それは、免疫グロブリンH鎖またはL鎖(または単一ポリペプチドの一部としての両鎖)でありうる。第2の免疫グロブリンパートナーは、特定の免疫グロブリンクラスまたはイソ型に限定されない。さらに、第2の免疫グロブリンパートナーは、Fab、またはF(ab) 2に見られるように、免疫グロブリン不変領域の一部を含みうる(すなわち、適当なヒト不変領域または枠組み構造領域の分離した部分)。第2の融合パートナーはまた、宿主細胞の外表面上に露出した膜内在性蛋白質をコードしている配列を例えば、ファージディスプレーライブラリーの一部として、または分析的または診断的検出のための蛋白質、例えば、西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)、 β -ガラクトシダーゼなどをコードしている配列を含んでいてもよい。

[0029]

Fv、Fc、Fd、Fab、Fab、またはF(ab)」2なる語は、それらの標準的な意味で用いられる。(例えば、Harlowら、"Antibodies A Laboratory Manual", Cold Spring Harbor Laboratory, (1988)を参照のこと。)

本明細書で使用される場合、「操作された抗体」なる語は、改変抗体の型、すなわち、全長の合成抗体(例えば、抗体フラグメントとは対照的に、キメラ、ヒト化抗体、新形態または免疫学的にエディットされたヒト抗体)であって、ここに、選択されたアクセプター抗体のLおよび/または日鎖可変ドメインの一部が選択されたエピトープに対して特異性を有する1以上のドナー抗体の類似部分によって置換されている抗体を示す。例えば、かかる分子は、非修飾L鎖(またはキメラL鎖)と結合したヒト化日鎖またはその逆によって特徴付けられる抗体を包含しうる。操作された抗体はまた、ドナー抗体結合特異性を保持するために、アクセプター抗体Lおよび/または日鎖可変ドメイン枠組み構造領域をコードしている核酸配列の改変によって特徴付けられうる。これらの抗体は、アクセプタ

一抗体由来の1以上のCDR(好ましくは全て)の本明細書に記載のドナー抗体由来のCDRによる置換を含むことができる。

[0030]

「キメラ抗体」なる語は、異種の種由来のアクセプター抗体から由来のLおよびH鎖不変領域と結合したドナー抗体から由来の天然に生じる可変領域(L鎖およびH鎖)を含有する操作された抗体の型をいう。

「ヒト化抗体」なる語は、非ヒトドナー免疫グロブリンから由来のそのCDRを有し、分子の残りの免疫グロブリン由来部分が1以上のヒト免疫グロブリンから由来である操作された抗体の型をいう。さらに、枠組み構造支持残基は、結合アフィニティーを保存するように改変されうる(例えば、Queenら、Proc. Nat'1. Acad. Sci. USA, 86, 10029-10032 (1989), Hodgsonら、Bio/Technology, 9, 421 (1991)を参照のこと)。

[0031]

「免疫学的にエディットされた抗体」なる語は、エディットされた抗体で治療されるべき患者において抗体に対する免疫学的応答の可能性を減少させることを目的としたクローニング人工産物、生殖細胞系増強などに関する領域をエディットするようにドナーおよび/またはアクセプター配列において変化を起こした操作された抗体の型をいう。

「ドナー抗体」なる語は、ドナー抗体の抗原特異性および中和活性特徴と共に 改変された免疫グロブリンコーディング領域および得られる発現した改変抗体を 提供するように、その可変領域、CDRまたはその他の機能的フラグメントもしくはその類似体の核酸配列を第一の免疫グロブリンパートナーに与える抗体(モノクローナルまたは組換え)をいう。本発明における使用に適当な1のドナー抗体は、Fab $G\lambda-1$ と称されるヒト中和モノクローナル抗体のFabフラグメントである。Fab $G\lambda-1$ は、図3、4、8A-8Fおよび9A-9E(配列番号1-4、13および14)に示されるような可変LおよびH鎖DNAおよびアミノ酸配列 $G\lambda-1$ を有するものとして定義される。

[0032]

「アクセプター抗体」なる語は、そのHおよび/またはL鎖枠組み構造領域お

よび/またはそのHおよび/またはL鎖不変領域をコードしている核酸配列の全て(またはいずれか一部、好ましくは全て)を第一の免疫グロブリンパートナーに与える、ドナー抗体に遺伝学的に無関係の供給源由来の抗体(モノクローナルまたは組換え)をいう。好ましくは、ヒト抗体はアクセプター抗体である。

[0033]

「CDR」なる語は、免疫グロブリンHおよびL鎖の超可変領域である抗体の相補性決定領域アミノ酸配列として定義される(例えば、Kadatら、Sequences of Proteins of Immunological Interest、第4版、U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health (1987)を参照)。免疫グロブリンの可変部分において3つのH鎖および3つのL鎖CDR領域(またはCDR領域)がある。したがって、本明細書で使用される場合、「CDR」なる語は、3つのH鎖CDRの全て、または3つのL鎖CDRの全て(または適当ならば、全Hおよび全L鎖CDRの両方)をいう。CDRは、抗原またはエピトープに対する抗体の結合のための大量の接触残基を提供する。本発明における目的のCDRは、ドナー抗体可変HおよびL鎖配列由来であり、天然に生じるCDRの類似体を包含し、その類似体はまた、それらが由来するドナー抗体と同じ抗原結合特異性および/または中和能力を共有または保持する。

[0034]

「抗原結合特異性または中和能力を共有する」なる語は、例えば、 $Fab\ G\lambda-1$ はある特定のレベルの抗原アフィニティーによって特徴付けられるが、適当な構造環境において $Fab\ G\lambda-1$ の核酸配列によってコードされるCDRはより低いまたは高いアフィニティーを有する可能性があることを意味する。にもかかわらず、かかる環境において $Fab\ G\lambda-1$ のCDRは、無傷 $Fab\ G\lambda-1$ と同じエピトープを認識するであろうことが予想される。「機能的フラグメント」は、そのフラグメントが由来する抗体と同じ抗原結合特異性および/または中和能力を保持する、部分的HまたはL鎖可変配列(例えば、免疫グロブリン可変領域のアミノまたはカルボキシ末端での少量の欠失)である。

[0035]

「類似体」は、少なくとも1つのアミノ酸によって修飾されたアミノ酸配列で

あり、ここに、該修飾は、化学的修飾であることができ、または2、3個のアミノ酸(すなわち、10個未満)の置換または再配置であることができ、その修飾は、該アミノ酸配列が非修飾配列の生物学的特徴、例えば、抗原特異性および高アフィニティーを保持することを可能にする。例えば、ある種のエンドヌクレアーゼ制限部位をCDR-エンコーディング領域内または周囲に作成する場合、置換によって(サイレント)突然変異を構築することができる。

[0036]

類似体は、また、対立遺伝子変異として生じてもよい。「対立遺伝子変異または修飾」は、本発明のアミノ酸またはペプチド配列をコードしている核酸配列における改変である。かかる変異または修飾は、遺伝コードの縮重に起因するか、または、所望の特徴を提供するように故意に操作されるものである。これらの変異または修飾は、いずれかのコードされたアミノ酸配列における改変を生じても生じなくてもよい。

[0037]

「エフェクター剤」なる語は、改変抗体、および/またはドナー抗体の天然もしくは合成のLまたはH鎖あるいはドナー抗体の他のフラグメントが常法により結合しうる非蛋白質担体分子をいう。かかる非蛋白質担体は、診断分野において使用される慣用的な担体、例えば、ポリスチレンまたは他のプラスチックビーズ、多糖類、例えば、BIAcore (Pharmacia)システムにおいて使用されるような多糖類、または医学分野において有用であって、ヒトおよび動物への投与に安全な他の非蛋白質物質を包含することができる。他のエフェクター剤は、重金属原子または放射性同位体をキレートするための大環状環を包含しうる。かかるエフェクター剤、例えば、ポリエチレングリコールは、また、改変抗体の半減期を増加するのに有用でありうる。

[0038]

II. コンビナトリアルクローニング

上記のように、いくつかの問題が、ハイブリドーマ技術のヒトモノクローナル 抗体の作成および単離への直接的応用を阻害してきた(G. KohlerおよびC. Mils tein, Nature, 256: 495-497 (1975))。これらのなかでも、ハイブリドーマ細 胞系統を形成するために用いられる適当な融合パートナーミエローマ細胞系統がないことならびに形成された場合でもかかるハイブリドーマの安定性が乏しいことである。これらの欠点は、末梢循環におけるウイルス特異的B細胞の不足のため、RSVの場合においてさらに悪化する。したがって、コンビナトリアルクローニングの分子生物学的アプローチが好ましい。

[0039]

コンビナトリアルクローニングは、一般的に、PCT公開第WO90/14430号に開示されている。簡単に言えば、コンビナトリアルクローニングの目的は、細菌細胞の集団にヒト細胞、組織または器官の免疫学的遺伝子キャパシティーを移入することである。免疫適格性の細胞、組織または器官を用いることが好ましい。特に有用な供給源は、限定するものではないが、脾臓、胸腺、リンパ節、骨髄、扁桃および末梢血リンパ球を包含する。細胞は、イン・ビトロでRSVによって刺激されていてもよく、または免疫応答を生じたことがわかっているドナーもしくはHIV $^+$ であるが無症候性のドナーから選択されうる。

[0040]

ドナー細胞から単離された遺伝子情報は、DNAまたはRNAの形態であることができ、都合のよいことには、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)または同様の技術によって増幅される。RNAとして単離される場合、遺伝子情報は好ましくは、増幅前に逆転写によってcDNAに変換される。増幅は総合的であるかまたはより詳細に調整されることができる。例えば、PCRプライマー配列の注意深い選択によって、免疫グロブリン遺伝子または遺伝子のクラス内のサブセットの選択的増幅を達成することができる。

[0041]

いったん成分遺伝子配列、この場合、種々のHおよびL抗体鎖の可変領域をコードしている遺伝子を得たならば、LおよびH鎖遺伝子をランダムな組み合わせで結合してランダムコンビナトリアルライブラリーを形成する。コンビナトリアルクローニングを容易にするための種々の組換えDNAベクター系が記載されている(例えば、PCT公開第WO90/14430前掲;ScottおよびSmith,Science 249:386-406 (1990);または米国特許第5223409号参照)。コンビ

ナトリアルライブラリーを作成すると、発現後、都合のよいことには生産物をRSVF蛋白質でバイオパンニングすることによって、または必要ならば、より詳細に下記するようなエピトープ遮断バイオパンニングによってスクリーンできる。

本明細書に記載するように、コンビナトリアルクローニングおよびスクリーニングには1本鎖抗体を使用することが好ましく、次いで、所望の候補分子の選択後に、それらを全長mAbに変換する。しかしながら、mAbのFabフラグメントもまた、クローニングおよびスクリーニングに使用することができる。

[0042]

III. 抗体フラグメント

本発明は、RSVのF蛋白質に向けられた誘導全長mAbに対するscFv、FabまたはF(ab')。フラグメントの使用を意図する。これらのフラグメントは独立して、RSV一媒介性症状に対するイン・ビボでの保護的および治療的物質としてまたはRSV診断の一部としてイン・ビトロで有用でありうるが、それらは、新形態ヒト抗体の成分として本明細書において使用される。scFvフラグメントは、LーリンカーーHまたはHーリンカーーL配向のいずれかにおいて約12アミノ酸のリンカーによって連結されたLおよびH鎖可変領域を含有する。Fabフラグメントは、全L鎖とH鎖のアミノ末端部分を含有し;F(ab')。フラグメントは付加的なジスルフィド結合によって結合された2つのFabフラグメトによって形成されたフラグメントである。RSV結合モノクローナル抗体は、コンビナトリアルファージライブラリーから得ることのできるscFvまたはFabフラグメントの供給源を提供する(例えば、Winterら、Ann. Rev. Immunol.,12: 433-455(1994)またはBarbasら、Proc. Nat'l. Acad. Sci. (USA) 89, 10164-10168(1992)参照、どちらもこれにより、出典明示により全体として組み込まれる)。

[0043]

IV. 目的の抗-RSV抗体アミノ酸およびヌクレオチド配列

 $FabG\lambda-1$ または本明細書に記載の他の抗体は、ドナー抗体の抗原結合特異性によって特徴付けられる種々の改変抗体の設計および獲得に有用な配列、

例えば、可変Hおよび/またはL鎖ペプチド配列、枠組み構造配列、CDR配列 、機能的フラグメント、およびその類似体、およびそれをコードしている核酸配 列を与えうる。

[0044]

一例として、このように本発明は、RSVヒトFab G λ -1A由来の可変 L鎖および可変H鎖配列およびそれから由来の配列を提供する。Fab G λ -1AのH鎖可変領域は、図4、8A-8Fおよび10A-10B(配列番号3-4、13および15)に示される。

[0045]

可変L鎖およびH鎖ペプチド配列をコードしている本発明の核酸配列またはそのフラグメントは、また、CDRまたは枠組み構造領域をコードしている核酸配列内における特定の変化の突然変異誘発性導入、および発現用プラスミド中への得られた修飾または融合核酸配列の組み込みに有用である。例えば、枠組み構造およびCDRーエンコーディング領域のヌクレオチド配列におけるサイレント置換は、突然変異を起こさせたCDR(および/または枠組み構造)領域の挿入を容易にする制限酵素部位を作成するために使用することができる。これらのCDRーエンコーディング領域は、本発明の新形態ヒト抗体の構築に用いてもよい。

[0046]

遺伝コードの縮重を考慮して、本発明の可変HおよびL鎖アミノ酸配列および CDR配列ならびにドナー抗体の抗原特異性を共有するその機能的フラグメント および類似体をコードする種々のコーディング配列が構築されうる。可変鎖ペプチド配列またはCDRをコードしている本発明の単離核酸配列またはそのフラグメントは、第2の免疫グロブリンパートナーと作動可能に結合される場合、改変 抗体、例えば、キメラまたはヒト化抗体、または本発明の他の操作された抗体を生産するために使用することができる。

[0047]

本明細書に記載の改変抗体の一部をコードしている単離核酸配列のほかに、天 然CDR-エンコーディング配列に相補的な配列またはCDR-エンコーディン グ領域の周囲のヒト枠組み構造領域に相補的な配列のような他のかかる核酸配列 が本発明に包含されることに注目すべきである。かかる配列は、遺伝コードの縮重によって図3および4(配列番号2および4)に示されるのと同じアミノ酸配列をコードできる全ての核酸配列を包含する。図6および7(配列番号5-12)は、かかる配列の提示を提供する。本発明に包含される他の有用なDNA配列は、ストリンジェントなハイブリダイゼーション条件下(T. Maniatisら、Molecular Cloning(A Laboratory Manual,Cold Spring Harbor Laboratory(1982),pages 387–389参照)で $G\lambda-1$ 抗体をコードしているDNA配列(例えば、図3、4、8A-8F~11(配列番号1-4、13-16)の配列)にハイブリダイズし、該抗体の抗原結合性を保持する配列を包含する。1のかかるストリンジェントなハイブリダイゼーション条件の例は、4×SSC、65℃でハイブリダイゼーションし、次いで、0.1×SSC、65℃で1時間洗浄する。別法では、例示的ストリンジェントなハイブリダイゼーション条件は、50%ホルムアミド、4×SSC中42℃である。好ましくは、これらのハイブリダイズするDNA配列は、少なくとも約18ヌクレオチド長、すなわち、およそのCDRの大きさである。

[0048]

V. 改変された免疫グロブリンコーディング領域および改変抗体

改変された免疫グロブリンコーディング領域は、キメラ抗体、ヒト化、新形態および免疫学的にエディットされたヒト抗体のような操作された抗体を包含する改変抗体をコードする。所望の改変された免疫グロブリンコーディング領域は、アクセプター免疫グロブリンパートナー中に挿入される、RSV抗体、好ましくは、本発明によって提供されるような高アフィニティー抗体の抗原特性を有するペプチドをコードするCDRーエンコーディング領域をscFv領域の形態で含有する。

[0049]

アクセプターが免疫グロブリンパートナーである場合、上記のように、それは、目的の第2の抗体領域、例えば、Fc領域をコードしている配列を包含する。免疫グロブリンパートナーは、また、それに対してLまたはH鎖不変領域がフレーム内でまたはリンカー配列の手段によって融合する別の免疫グロブリンをコー

ドしている配列を包含しうる。RSVの機能的フラグメントまたは類似体に向けられた操作された抗体は、同じ抗体との強化された結合をもたらすように設計されていてもよい。

[0050]

免疫グロブリンパートナーは、また、免疫グロブリンパートナーが常法により 作動可能に連結されうる非蛋白質担体分子を包含する上記のエフェクター剤と結 合していてもよい。

免疫グロブリンパートナー、例えば、抗体配列とエフェクター剤との間の融合 または結合は、いずれかの適当な手段によって、例えば、慣用的な共有結合また はイオン結合、蛋白質融合、またはヘテロー二官能性交差リンカー、例えば、カ ルボジイミド、グルタルアルデヒドなどによるものであってもよい。かかる技術 は当該分野で既知であり、従来の化学および生物化学テキストに容易に記載され ている。

[0051]

さらに、単に第2の免疫グロブリンパートナーとエフェクター剤の間に所望の 量の空間を提供するにすぎない慣用的なリンカー配列もまた、改変された免疫グロブリンコーディング領域中に構築されてもよい。かかるリンカーの設計は当業 者によく知られている。

さらに、本発明の分子のシグナル配列を発現を増加するように修飾してもよい。例えば、 $FabG\lambda-1H$ 鎖配列由来のシグナル配列およびCDRを有する新形態ヒト抗体は、キャンパス(Campath)リーダー配列のような別のシグナル配列で置換された元のシグナルペプチドを有していてもよい(Page, M. J. ら、BioTechnology 9:64-68(1991)。

例示的な改変抗体、新形態ヒト抗体は、第2のヒト抗体から由来の不変H領域 $C_{H-1}-C_{H-3}$ に融合したFab $G\lambda-1$ の抗原特異性を有する可変Hおよび全L鎖ペプチドまたは蛋白質配列を含有する。

[0052]

またさらなる具体例において、本発明の操作された抗体は、それに付加的な物質を接着させていてもよい。例えば、組換えDNA技術の手法を用いて、Fcフ

ラグメントまたは完全な抗体分子の $C_{H-2}C_{H-3}$ ドメインが酵素または他の検出可能な分子(すなわち、ポリペプチドエフェクターまたはリポーター分子)によって置換された本発明の操作された抗体を生産してもよい。

本発明のもう1つ別の所望の蛋白質は、全長のHおよびL鎖を有する完全な抗体分子、またはそのいずれかの分離したフラグメント、例えば、FabまたはFab3、Fab4、Fab5、Fab5、Fab5、Fab7、Fab8、Fab9 Fab9 Fab

[0053]

免疫グロブリンパートナーがドナー抗体と異なる抗体、例えば、いずれかのイソ型または免疫グロブリン枠組み構造もしくは不変領域のクラス由来であるときは必ず、操作された抗体が生じる。操作された抗体は、1の供給源、例えば、アクセプター抗体由来の免疫グロブリン(Ig)不変領域および可変枠組み構造領域、およびドナー抗体、例えば、本明細書に記載の抗-RSV抗体由来の1以上の(好ましくは、全ての)CDRを含むことができる。さらに、核酸またはアミノ酸レベルにおけるアクセプターmAb Lおよび/またはH可変ドメイン枠組み構造領域またはドナーCDR領域の改変、例えば、欠失、置換または付加は、ドナー抗体抗原結合特異性を保持するために、または潜在的な免疫原性を減少させるために作成されうる。

[0054]

かかる操作された抗体は、RSV mAb (記載のように修飾されていてもよい)の可変Hおよび/またはL鎖の1つ(または両方)あるいは下記で同定されるHまたはL鎖CDRの1以上を用いるように設計される。本発明の操作された抗体は、中和性であり、すなわち、それらは、望ましくは、RSV感染の動物モデルにおいてイン・ビトロおよびイン・ビボでウイルス増殖を阻害する。

[0055]

かかる操作された抗体は、RSV抗体機能的フラグメントに融合したヒトHお

よびL鎖不変領域を含有する新形態ヒト抗体を包含しうる。適当なヒト(または他の動物)アクセプター抗体は、慣用的なデータベース、例えば、KABAT R(登録商標)データベース、Los AlamosデータベースおよびSwissProteinformation に対するホモロジーによって選択されたものであってもよい。ドナー抗体の枠組み構造領域に対するホモロジー(アミノ酸に基づく)によって特徴付けられるヒト抗体は、ドナーCDRを挿入するためのH鎖不変領域および/またはH鎖可変枠組み構造領域を提供するのに適当でありうる。L鎖不変または可変枠組み構造領域を提供するのに適当なアクセプター抗体は、同様に選択されうる。アクセプター抗体HおよびL鎖が同じアクセプター抗体から由来する必要がないことに注目すべきである。

[0056]

望ましくは、異種枠組み構造および不変領域をヒト免疫グロブリンクラスおよ びイソ型、例えば、IgG(4のうちサブタイプ1)、IgM、IgAおよびI g E から選択する。F c ドメインは、天然配列に限定されないが、機能を改変す る当該分野で既知の突然変異変種を包含する。例えば、突然変異は、ある特定の IgG抗体のFcドメインにおいてFc-媒介性補体およびFc受容体結合を減 少させ (A.R. Duncanら、Nature, 332:563-564 (1988); A.R. DuncanおよびG. W inter, Nature, 332:738-740 (1988); M.L. Alegre 5, J. Immunol. 148: 3461-3468 (1992); M.-H. Taoら、J. Exp. Med. 178:661-667 (1993);およびV. Xuら 、J. Biol. Chem., 269:3469-2374 (1994)); クリアランス率を改変し(J. K. Kimら、Eur. J. Immunol., 24: 542-548 (1994)) ; 構造的異種性を減少させる (S. Angalら、Mol. Immunol. 30: 105-108 (1993)) ことが記載された。また、 IgMの尾部セグメントの付加または他の突然変異 (R.I.F. SmithおよびS.L. M orrison, Biotechnology 12: 683-688 (1994); R.I.F. Smithb, J. Immunol., 154: 2226-2236 (1995)) あるいは I g Aの尾部セグメントの付加 (I. Karivら、 J. Immunol., 157: 29-38 (1996)) による抗体のオリゴマー化のような他の修飾 が可能である。しかしながら、アクセプター抗体は、ヒト免疫グロブリン蛋白質 配列のみを含む必要はない。例えば、ヒト免疫グロブリン鎖のDNA配列エンコ

ーディング部分がポリペプチドエフェクターまたはレポーター分子のような非免疫グロブリンアミノ酸配列をコードしているDNA配列に融合している遺伝子を構築してもよい。

[0057]

したがって、改変抗体は、好ましくは、天然ヒト抗体またはそのフラグメントの構造を有し、効果的な治療的用途、例えば、ヒトにおけるRSV媒介疾患の治療または診断的用途に必要とされる特性の組み合わせを有する。

改変抗体がさらに、ドナー抗体の特異性および高アフィニティーに決して影響を及ぼすことなく、可変ドメインアミノ酸における変化によって修飾されうることは、当業者に理解されるであろう(すなわち、類似体)。HおよびL鎖アミノ酸が可変ドメイン枠組み構造またはCDRまたはその両方において他のアミノ酸によって置換されうることは予想される。特に、本明細書における実施例に説明されるように、かかる再構築された配列の免疫学的エディティングが好ましい。

[0058]

さらに、可変または不変領域は、上記のように、本発明の分子の選択的特性を強化または減少するように改変されうる。例えば、2量化、Fc受容体への結合、または補体を結合し活性化する能力である(例えば、Angalら、Mol. Immunol., 30: 105-108(1993); Xuら、J. Biol. Chem. 269: 3469-3474(1994);およびWinterら、EP 307, 434-B参照)。

かかる抗体は、下記のように、RSV媒介疾患の予防および治療に有用である

[0059]

V I. 改変抗体および操作された抗体の生産

本発明の得られる新形態ヒト抗体は、組換え宿主細胞、例えば、COS、CH Oまたはミエローマ細胞において発現できる。慣用的な発現ベクターまたは組換えプラスミドは、改変抗体のこれらのコーディング配列を宿主細胞中における複製および発現および/または宿主細胞からの分泌を制御できる慣用的な調節配列と作動可能に結合して配置することによって生産される。調節配列は、他の既知の抗体から得ることのできるプロモーター配列、例えば、CMVプロモーター、

およびシグナル配列を包含する。同様に、相補的抗体LまたはH鎖をコードする DNA配列を有する第2発現ベクターを生産することができる。好ましくは、該第2発現ベクターは、コーディング配列および選択マーカーが関係することを除き、第1のベクターと同一である。これは、可能な限り、各ポリペプチド鎖が機能的に発現されることを保証する。別法では、改変抗体のHおよびL鎖コーディング配列は、単一ベクター上に残存しうる。

[0060]

選択された宿主細胞は、慣用的な技術によって、第一および第二のベクターと同時トランスフェクトして(または単純に単一ベクターでトランスフェクトして)、組換えまたは合成しおよびH鎖の両方を含む本発明のトランスフェクト宿主細胞を作成する。次いで、トランスフェクト細胞を慣用的な技術によって培養して、本発明の操作された抗体を生産する。組換えH鎖およびL鎖の両方のアソシエーションを包含する抗体の生産は、固相酵素免疫アッセイ(ELISA)またはラジオイムノアッセイ(RIA)のような適当なアッセイによって培養物中において測定される。同様の慣用的な技術を用いて、本発明の他の改変抗体および分子を構築してもよい。

[0061]

本発明の方法および本発明の組成物の構築において用いられるクローニングおよびサブクローニング段階に適当なベクターは、当業者によって選択されるうる。例えば、慣用的なpUCシリーズのクローニングベクターが用いられる。使用される1のベクターはpUC19であり、Amersham(Buckinghamshire, United Kingdom)またはPharmacia(Uppsala, Sweden)のような供給会社から市販されている。容易に複製でき、クローニング部位および選択遺伝子(例えば、抗生物質耐性)を豊富に有し、取り扱いが簡単ないずれのベクターをクローニングに用いてもよい。したがって、クローニングベクターの選択は、本発明における制限的因子ではない。

[0062]

同様に、本発明による操作された抗体の発現に用いられるベクターは、いずれ かの慣用的なベクターから当業者によって選択されうる。好ましいベクターは、 例えば、pCDまたはpCNを包含する。ベクターは、また、選択された宿主細胞中における異種DNA配列の複製および発現を指示する選択された調節配列(例えば、CMVプロモーター)を含有する。これらのベクターは、操作された抗体または改変された免疫グロブリンコーディング領域をコードする上記のDNA配列を含有する。さらに、ベクターは、即座の操作に望ましい制限部位の挿入によって修飾された選択された免疫グロブリン配列を組み込んでいてもよい。

[0063]

発現ベクターは、また、異種DNA配列、例えば、哺乳動物ジヒドロ葉酸レダクターゼ遺伝子(DHFR)の発現を増幅するのに適当な遺伝子によって特徴付けられうる。他の好ましいベクター配列は、ウシ成長ホルモン(BGH)およびベータグロビンプロモーター配列(betaglopro)のようなポリアデニル化(ポリA)シグナル配列を包含する。本明細書において有用な発現ベクターは、当業者によく知られた技術によって合成されうる。

かかるベクターの成分、例えば、レプリコン、選択遺伝子、エンハンサー、プロモーター、シグナル配列などは、選択された宿主中における組換えDNAの生産物の発現および/または分泌を指示するのに使用するために、商業的または天然起源から得ても、または既知の手法によって合成されてもよい。哺乳動物、細菌、昆虫、酵母および真菌発現の分野において多数の型が知られている他の適当な発現ベクターもまた、この目的のために選択されうる。

[0064]

本発明は、また、操作された抗体またはその改変された免疫グロブリン分子のコーディング配列を含有する組換えプラスミドでトランスフェクトされた細胞系統を包含する。これらのクローニングベクターのクローニングおよび他の操作に有用な宿主細胞もまた、慣用的である。しかしながら、もっとも望ましいことに、イー・コリ(E. coli)の種々の系統由来の細胞は、クローニングベクターの複製および本発明の改変抗体の構築における他の段階に使用される。

本発明の操作された抗体または改変抗体の発現に適当な宿主細胞または細胞系統は、好ましくは、CHO、COS、繊維芽細胞(例えば、3T3)および骨髄細胞のような哺乳動物細胞、より好ましくは、CHOまたは骨髄細胞である。ヒ

ト細胞を使用してもよく、したがって分子をヒトグリコシル化パターンで修飾できる。別法では、他の真核細胞系統を用いてもよい。適当な哺乳動物宿主細胞の選択および形質転換、培養、増幅、スクリーニングならびに生産物生産および精製の方法は当該分野で既知である。例えば、SambrookらMolecular Cloning (A Laboratory Manual), 2nd edit., Cold Spring Harbor Laboratory (1989)を参照のこと。

[0065]

細菌細胞は、本発明の組換えs c F v 、F a b およびMA b の発現に適当な宿主細胞として有用であることが証明されうる(例えば、Plueckthun, A., Immuno 1. Rev., 130, 151-188 (1992))。F a b は通常グリコシル化せず、発現を輸出するように操作でき、それにより、ミスフォールディングを容易にする高濃度を低下させることができるので、細菌細胞において発現された蛋白質が非フォールディングまたは不適当なフォールディング形態あるいは非グリコシル化形態である傾向は、たいして問題ではない。にもかかわらず、細菌細胞において生産されたいずれの組換えFabb、抗原結合能力の保持についてスクリーンされるであろう。細菌細胞によって発現された分子が適当に折りたたんだ形態で生産された場合、その細菌細胞は望ましい宿主であろう。例えば、発現に使用されるイー・コリの種々の系統は、バイオテクノロジーの分野において宿主細胞としてよく知られている。ビー・ズブチリス(B. subtilis)、ストレプトミセス(Streptomy ces)の種々の系統、他の細菌などもまた、使用されうる。

[0066]

所望により、当業者に知られた酵母細胞もまた、昆虫細胞、例えば、ドロソフィラ (Drosophila) およびレピドプテラ (Lepidoptera) およびウイルス発現系と同様に宿主細胞として利用可能である (例えば、Millerら、Genetic Engineering, 8, 277-298, Plenum Press (1986)およびそこに引用される参考文献を参照のこと)。

本発明のベクターを構築しうる一般的な方法、本発明の宿主細胞を生産するの に必要なトランスフェクション方法および本発明の改変抗体をかかる宿主細胞か ら生産するのに必要な培養法は全て、慣用的な技術である。同様に、いったん生 産されたならば、本発明の改変抗体は、硫酸アンモニウム沈殿、アフィニティーカラム、カラムクロマトグラフィー、ゲル電気泳動などを包含する当該分野の標準的な手法にしたがって、細胞培養内容物から精製されうる。かかる技術は、当該分野の技術内であり、本発明を制限しない。

[0067]

新形態抗体のまた別の発現方法は、トランスジェニック動物における発現を利用しうる。例示的系は、米国特許第4873316号に記載されている。該参考文献に記載された発現系は、動物のカゼインプロモーターを使用し、哺乳動物中にトランスジェニック的に組み込まれた場合、雌が所望の組換え蛋白質をその乳中に生産することが可能である。

[0068]

いったん望ましい方法によって発現したならば、次いで、操作された抗体を適当なアッセイを用いてイン・ビトロ活性について試験する。現在、RSVに対する改変抗体の定性および定量的結合を評価するために、慣用的なELISAアッセイ様式が用いられる。さらに、他のイン・ビトロアッセイおよびイン・ビボ動物モデルもまた、通常のクリアランスメカニズムにもかかわらず体における改変抗体の持続性を評価するために行われるその後のヒト臨床的研究の前に、中和効力を確かめるために用いてもよい。

[0069]

VII. 治療的/予防的用途

本発明はまた、本明細書に記載の1以上の抗体(改変、新形態、モノクローナルなど)またはそのフラグメントを包含する有効量の抗体を投与することを特徴とするRSVに関連した症状を体験しているヒトを治療する方法に関する。

本発明の分子の使用によって誘導される治療的応答は、RSVへの結合により生じ、したがってその後、RSV繁殖を阻害する。したがって、本発明の分子は、治療的用途に適した調製物および処方における場合、RSV感染を体験しているヒトに大いに望ましい。例えば、季節的な症状の発現などを治療する場合、より長期の治療が望ましい。投与量および治療の持続期間は、ヒト循環における本発明の分子の相対的な存続期間に関係し、治療されるべき状態および患者の総体

的な健康に依存して当業者によって調整されることができる。

[0070]

本発明の改変抗体、抗体およびそのフラグメントは、また、単独または他の抗体、特に、F蛋白質上の他のエピトープまたは他のRSV標的抗原と反応するヒトまたはヒト化mAbを予防的薬剤として一緒に使用してもよい。

本発明の治療および予防的薬剤の投与様式は、宿主に薬剤をデリバリーするいずれかの適当な経路であってもよい。本発明の改変抗体、抗体、操作された抗体およびそのフラグメント、および医薬組成物は、非経口投与、すなわち、皮下、筋内、静脈内または鼻腔内に特に有用である。

[0071]

本発明の治療および予防的薬剤は、本発明の有効量の改変抗体を活性成分として医薬上許容される担体中において含有する医薬組成物として調製されうる。注射用に準備された形態において、好ましくは生理学的pHに緩衝化された抗体を含有する水性懸濁液または溶液が好ましい。非経口投与用組成物は、一般に、医薬上許容される担体、好ましくは水性担体中に溶解した本発明の操作された抗体またはそのカクテルの溶液を含むであろう。種々の水性担体を用いてもよく、例えば、0.4%セーライン、0.3%グリシンなどである。これらの溶液は、滅菌状態であり、一般に、粒子物質を含有しない。これらの溶液は、慣用的なよく知られた滅菌技術(例えば、ろ過)によって滅菌されうる。組成物は、およその生理学的条件に必要とされるようなpH調整剤および緩衝化剤などの医薬上許容される補助物質を含有しうる。かかる医薬処方中における本発明の抗体の濃度は、幅広く変化することができ、すなわち、約0.5重量%より少ないものから、通常または少なくとも1重量%、15または20重量%ほどの大きさまでで変化でき、選択された特定の投与様式にしたがって、主に流体容積、粘度などに基づいて選択されるであろう。

[0072]

したがって、筋内注射用の本発明の医薬組成物は、 $1 \, \text{mL}$ 滅菌緩衝化水および約 $1 \, \text{ng} \sim 約100 \, \text{mg}$ 、例えば、約 $5 \, \text{ng} \sim 約80 \, \text{mg}$ またはより好ましくは、約 $5 \, \text{mg} \sim 約75 \, \text{mg}$ の本発明の操作された抗体を含有するように調製でき

た。同様に、静脈内注入用の本発明の医薬組成物は、約250m1の滅菌リンガー被および約1mg~約75mg/m1および好ましくは5mg~約50mg/m1の本発明の操作された抗体を含有するように調製できた。非経口投与可能な組成物を調製するための実際の方法は、よく知られているか、または当業者に明らかであり、例えば、"Remington's Pharmaceutical Science", 15 版,Mack Publishing Company,Easton,Pennsylvaniaにおいてより詳細に記載されている

[0073]

医薬調製物における場合、本発明の治療剤および予防が単位投与形態で存在することが好ましい。適当な治療上有効投与量は、当業者によって容易に決定できる。ヒトまたは他の動物において炎症性疾患を効果的に治療するために、体重 70~k~g あたり約0.~1~m~g ~約2~0~m~g の1~2 投与量の本発明の蛋白質または抗体を非経口、好ましくは、静脈内または筋内投与すべきである。かかる投与量を、必要ならば、内科医によって適宜選択された適当な時間間隔で繰り返してもよい

[0074]

本発明の改変抗体および操作された抗体は、また、RSV媒介疾患の決定またはかかる疾患の治療の進行を追跡するためのような診断的計画に用いてもよい。診断的試薬として、これらの改変抗体をELISAおよび血清、血漿または他の適当な組織中のRSVレベルまたは培養液中のヒト細胞によるその放出の測定のための他の慣用的なアッセイ様式において使用するために慣用的にラベルしてもよい。改変抗体を用いるアッセイの性質は慣用的であり、該開示を制限しない。

[0075]

本明細書に記載の抗体、改変抗体またはそのフラグメントは、保管のために凍結乾燥でき、使用前に適当な担体中で復元できる。該技術は、慣用的な免疫グロブリンで効果があることがわかっており、当該分野で既知の凍結乾燥および復元技術を用いることができる。

下記の実施例は、例示的な操作された抗体の構築および適当なベクターおよび 宿主細胞中におけるその発現を包含する本発明の種々の態様を説明するものであ り、本発明の範囲を制限するものとして解釈されるべきではない。全てのアミノ酸は慣用的な3文字表記または1文字表記によって示される。全ての必要な制限酵素、プラスミドおよび他の試薬および材料は、別記しない限り、商業的に入手可能である。全ての一般的なクローニングライゲーションおよび他の組換えDN A法は、T. Maniatisら(上掲)またはSambrookら(上掲)において行われたとおりであった。

[0076]

実施例1:Gλ-1 scFv-1の単離

1本鎖(s c)F v ライブラリーを故意にRS V に曝露した個体から調製し、記載の手法にしたがって組換えRS V F蛋白質に対して選択した(R. H. Jackso nb、Protein Engineering,A Practical Approach,A. R. Reesら編、Oxford University Press,chapter 12,pp. 277–301,1992;H. R. Hoogeboomb、Nucl. A cid Res.,19: 4133–4137(1991);J. D. Marksb、J. Mol. Biol.,222: 581–59 7(1991))。簡単に言えば、リンパ球を曝露後 1 5 日目に採取した血液試料から単離した。リンパ球から単離したRNAをファージディスプレーのための s c F Vエンコーディングレパートリーの調製に用いた。V領域プライマーのセットを日鎖ドメイン1 Ig Gおよび Ig MならびにL鎖C- κ およびC- λ のための不変領域プライマーと対にし、次いで、オーバーラップ P C R によって s c F v V H – V L 配向において 1 5 アミノ鎖スペーサー(グリシン λ ーセリン) 3(配列番号 2 1)と連結した(プライマーの記載について J. D. Marks ら(上掲)を参照)。

[0077]

得られた4つのscFvレパートリー(IgGおよびIgMを有する $V-\kappa$ 、IgGおよびIgMを有する $V-\lambda$)をpHEN1(H.R. Hoogenboomら(上掲))に類似したファージミドベクター中にクローン化し、scFvのファージ fdの遺伝子IIIへの融合をもたらした。次いで、エレクトロポレーションによってベクターをイー・コリ(例えば、TG1系統)中に形質転換して、対応するファージミドライブラリーを得た。

[0078]

scFv 一遺伝子 3 融合を展示するファージライブラリーをプラスミドライブラリーの各々をM13K07へルパーファージで感染させることによって調製し (R.H. Jackson (上掲))、個々に、プラスチック上にコートした組換えF蛋白質に対する2ラウンドのパンニングに付した。第1ラウンドにおいて、2.5 m 1リン酸緩衝化セーライン (PBS) / 2%Marval TM 脱脂乾燥ミルク中における10 11 ファージを90分間、5 μ g/m1のF蛋白質でコートした試験管中でインキュベートし(P. Tsui6、J. Immunol. 157: 772-780 (1996)に記載されている)、次いで、10xPBS/0.05% Tween20で1回洗浄し、10xPBS単独で2回目の洗浄を行った。結合したファージを10mMトリエチルアミンで溶出し、溶出液を1MTris-HCl、pH7.4で中和した。溶出したファージを増幅し、コーティングするためのF蛋白質の濃度が2 μ g/m1であり、洗浄バッファーが20xPBSを含有したことを除き、第2ラウンドの同様のパンニングに付した。

[0079]

イー・コリを溶出したファージで感染させ、各出発ライブラリー由来の96個のコロニーをヘルパーファージで重複感染させ、F蛋白質結合活性についてスクリーンした。たった4個の陽性クローンが2個のIgMライブラリーから得られたが、一方、41個の陽性クローンがIgGライブラリーについて観察された。部分配列分析によって、全クローンが3つの異なるH鎖の1つを有した。6個のクローンのHおよびL鎖V領域の完全な配列は、全て、IgGライブラリーから得られた。

[0080]

これらの6個のクローンの各々の滴定濃度(titered)ファージストックの連続希釈液を組換えF蛋白質およびRSV感染細胞ライゼートへの結合についてELISAによって試験した。全てがF蛋白質への結合を示し、 $G\lambda-1$ と呼ばれるファージが最も良好な活性を示した。しかしながら、 $G\lambda-1$ および3個の他のクローンは、RSVライゼートへの結合をほとんど示さなかった。

[0081]

3つのクローン: $G\lambda-1$ 、 $G\lambda-3$ (ライゼート結合陽性)、および $G\kappa-$

1(ライゼート結合陰性)(ここに、「 κ 」および「 λ 」はL鎖のクラスを示す)は、F蛋白質特異的中和モノクローナル抗体によるそれらの結合の競合およびウイルス感染を阻害するそれらの能力についてさらに特徴付けられた。 1992年3月19日に公開された国際特許出願公開第WO92/04381号、および1993年10月14日に公開された国際特許出願公開第WO93/20210号に記載された中和mAbRSV19およびB4は、F蛋白質上の別個のエピトープを認識する。 $G\kappa-1$ は、両方の抗体によって強く阻害された。 $G\lambda-1$ は、B4のみによって有意に阻害された。 $G\kappa-3$ は、いずれの抗体によっても阻害されなかった($G\lambda-1$ だけについて示される;図1Aおよび1B参照)。最初のアッセイにおいて(表 I、実験I-3)、3個のクローン全でがイン・ビトロで中和活性を示し、 $G\lambda-1$ は最も強力であった(図2、実験2のグラフ)が、一方、scFvを展示していない対照野性型ファージ(M13K07)は効果がなかった。

[0082]

中和がエピトープに関係なくウイルスのファージコーティングだけに起因しうるという可能性に注目するために、非中和Fab5-16のファージ調製物を同じアッセイにおいて試験した。4つのアッセイのうち3つにおいて、該調製物もまた良好な中和活性を示し、これらのアッセイのうち2つにおいて対照ファージと同様であった(表I、実験4-7)。Fab5-16および対照M13K07ファージの両方による可変中和のこの混乱する結果により、ウイルス中和研究は結論に達しなかった。

[0083]

【表1】

表I

_衣 1											
ファージ試	ウイルス中和 (IC ₅₀ x 10 ⁻⁷) ¹										
料	(aru または kru/ml) ²										
	実験番号										
	1	2	3	4	5	6	7				
Gк-1 a	1,600		<300								
ь				<10	<7						
Gλ-1 а		80	<300								
b				8.1	11						
c							120				
Gλ-3 a		900	<300	180							
ь					<7	10					
c							730				
M13K07a			>105	>105		>5,000					
Ъ					+全希釈	+全希釈	>104				
Fab 5-19a				>105	40	180					
Ъ							3.5				

凡例:

- 1 M. J. Cannon, J. Virol. Meth., 16:293-301によるアッセイ。100感染中心/ウェルのウイルスを示されたファージの希釈液と一緒に1時間インキュベートし、次いで、感受性細胞に3時間添加した。ウイルス/ファージ溶液を吸引し、新しい培地と交換し、細胞を一晩インキュベートした後、ウイルス感染細胞についてペルオキシダーゼ染色した。
- 2 a r u = アンピシリン耐性単位、ファージミド含有粒子の測定単位。 k r u = カナマイシン耐性単位、ファージゲノムを含有する粒子の測定単位 (M 1 3 K 0 7 対照の場合のみ)

[0084]

これらの結果を考えると、ファージストック対既知の濃度の抗体蛋白質に依存

する全てのアッセイによってより不明瞭になったが、(1)F - 蛋白質へのその見かけのより良好な結合、(2)B 4 抗体による結合のその選択的阻害および(3)ウイルス中和アッセイにおけるバックグラウンドを超えるその示唆される活性に基づいて、 $G\lambda-1$ が強力な中和抗体のための最も可能性のある候補として選択された。

[0085]

実施例 $2:G\lambda-1$ s c F V の m A b バージョン A への変換

 $G\lambda-1$ のVHおよびVL領域のDNAおよびコードされる蛋白質配列を各々、図3(配列番号1および2)および4(配列番号3および4)に示す。哺乳動物細胞における発現の場合、 $G\lambda-1$ プラスミド由来のH鎖可変領域およびL鎖可変領域を抗体鎖の発現がサイトメガロウイルスプロモーター(CMV)プロモーターによって制御されるプラスミド p CDN(Nambi, A. ら、Mol. Cell. Biochem., 131: 75-86(1994))の誘導体中にクローン化した。プラスミド p CDーHC 6 8 Bは、全長H鎖を発現するために用いられ、プラスミド p CNーHu L Cは全長L鎖の発現に用いられる。

[0086]

[0087]

該クローニングは、 $G\lambda-1$ の可変領域を別の抗-RSV H鎖194-F4の不変領域(ヒトハイブリドーマからSmithKline Beechamでクローン化された)

上に連結した。該中間体クローンをXhoIおよびBsp120Iで切断し、pCD-HC68B中における同じ部位に導入した。XhoI部位はPCRプライマーによってアミノ末端に導入され、pCD-HC68B中に同じ部位でクローン化した場合、キャンパスリーダー配列がフレーム中において先に位置する。Bsp120I部位は天然であり、 C_{II-1} ドメインの開始における高く保存された部位であり、pCD-HC68B中に同じ部位でクローン化した場合、 C_{II-1} の残りの配列からヒト IgG_1OC_{II-3} 領域と一緒にフレーム内にある。得られた構築物、 $G\lambda-1Apcd$ (図8A-8F(配列番号13))において、キャンパスリーダーのすぐ後のアミノ酸はEVQLLE(配列番号17)であり、ここに、残基LEはXhoIクローニング部位のヌクレオチド配列によってコードされている。

[0088]

可変領域のアミノ末端および枠組み構造 4 のためのプライマーを用いて、G λ -1 のL鎖をG λ -1 ファージミドDNAから P C R 増幅した。得られた P C R フラグメントを S a c I (アミノ末端プライマーによって導入された部位) および A v r I I (枠組み構造 4 における天然部位) で切断し、S a c I / A v r I I 部位で 43-1 p c n 中にクローン化した。該クローニングは、G λ -1 の可変領域をフレーム内で別の抗- R S V ラムダ L鎖 43 (P. Tsui ら、J. Immunol., 157: 772-780 (1996)) の不変領域 (ヒト脾臓から単離した R N A から由来のコンビナトリアルライブラリーから Smith Kline Beechamでクローン化された) 上に連結した。 P C R プライマーによってアミノ末端に S a c I 部位を導入し、同じ部位で 43 p c n 中にクローン化した場合、フレーム内でキャンパスリーダー配列が先に位置する。したがって、成熟 L鎖の最初の 2 つのアミノ鎖が削除される。得られた構築物、G λ -1 A p c n(図 9 A -9 E(配列番号 14))において、リーダーの直後の最初の 2 つのアミノ酸は E L であり、ここに、残基 E L は S a c I クローニング部位のヌクレオチド配列によってコードされている。

プラスミド $G\lambda-1$ Apc dおよび $G\lambda-1$ Apc nのヌクレオチド配列を各々、図8 A-8 F(配列番号13)および9 A-9 E(配列番号14)に示す。ベクターの該セットを用いて、COS細胞およびCHO細胞中において抗体 $G\lambda$

-1Aを生産した。

[0089]

実施例3:補正したGλ-1HおよびL鎖のクローニング

[0090]

最終的な構築物を配列決定して、H鎖のアミノ末端がEVQLLE(配列番号 17)からEVQLVE(配列番号18)に補正されたことを証明した(図6参照)。補正されたH鎖、 $G\lambda-1$ Bのコーディング領域のヌクレオチド配列を図 10A-10Bに示す(配列番号15)。

scFvフォーマットから全長フォーマットへのG λ -1L鎖の可変領域のクローニングにおいて、クローニング目的でアミノ末端に変化を導入した。詳細には、L鎖の最初の2つのアミノ酸(G1nおよびSer)を削除し、3番目のアミノ鎖をValからG1uへ変化させた。これらの変化を補正するために、pCN中にクローン化されたG λ -1L鎖のアミノ末端のためにPCRプライマーを設計し、それは、2つの欠失したアミノ酸(G1nおよびSer)を元の場所に置き、第3のアミノ酸をValに戻した。補正は、補正プライマーおよび外部5、および3、プライマーとして各々、CMVプロモーターおよび λ 不変領域内の配列にアニールするプライマーを用いるPCRオーバーラップ技術によって導入された。最終的なPCR産物を制限酵素、EcoRIおよびAvrIIで消化し、G λ -1Apcnベクター中に同じ部位でクローン化して、G λ -1Bpcn

を作成した。

[0091]

最終的な構築物を配列決定して、L鎖のアミノ末端が--ELからQSVL(配列番号100アミノ酸1-4)へ補正されたことを証明した。

補正されたL鎖のコーディング領域のヌクレオチド配列、 $G\lambda-1$ Bを図1 1 に示す(配列番号16)。該ベクター $G\lambda-1$ B p c n を $G\lambda-1$ B p c d と一緒に用いて、COS細胞およびCHO細胞中において抗体 $G\lambda-1$ Bを生産した

[0092]

実施例4:哺乳動物細胞におけるG $\lambda-1$ mABの生産

最初の特徴付けのために、各バージョンのm A b 構築物、G $\lambda-1$ A HおよびL鎖、G $\lambda-1$ B HおよびL鎖をC O S 細胞中において基本的にCurrent Protocols in Molecular Biology, eds F.N. Ausubelら、1988, John Wiley &; Sons, vol. 1, section 9.1に記載のように発現させた。トランスフェクション後 1 日目に、培養増殖培地を血清不含培地(SmithKline Beecham)で置き換え、それを3日目に交換した。公共に入手可能な培地、I T S TM P r e m i x、インスリン、トランスフェリン、セレニウム混合物(Collaborative Research,Bedford,MA)および1 m g / m 1 ウシ血清アルブミン(B S A)を捕捉したDME Mを用いて、同様の満足のいく結果が得られる。

[0093]

mAb は、3日および5日目の順化培地から標準的なプロテインAアフィニティークロマトグラフィー法(例えば、Protocols in Molecular Biologyに記載されている)によって、例えば、Prosep Aアフィニティー樹脂(Bioproces sing Ltd., UK)を用いて調製された。

より大量の $G\lambda-1$ B m A B (100-200 m g) を生産するために、ベクターを有標のCHO細胞系中に導入した。しかしながら、以前に記載されたように d h f r $^-$ C H O 細胞を用いて同様の結果が得られるであろう(P. Hensley ら、J. Biol. Chem., 269: 23949-23958 (1994))。簡単に言えば、全 30μ g の線状化プラスミドDNA(H鎖およびL鎖ベクターのAまたはBセットの各1

 5μ g)を 1×10^7 細胞中にエレクトロポレートした。細胞を最初に、96 ウェルプレート中においてヌクレオシド不含培地中で選択する。 $3\sim4$ 週間後、増殖陽性ウェル由来の培地をELISAアッセイを用いてヒト免疫グロブリンについてスクリーンする。最も高く発現するコロニーをトランスフェクトしたベクターの増幅について高濃度のメトトレキサート中において広げ、選択する。プロテインAアフィニティークロマトグラフィー(プロテインAセファロース、Pharma cia)、次いで、サイズ排除クロマトグラフィー(Superdex 200, Pharmacia)を用いる標準的な手法によって抗体を順化培地から精製する。

[0094]

溶出した抗体の濃度および抗原結合活性をELISAによって測定する。抗体含有フラクションをプールし、サイズ排除クロマトグラフィーによってさらに精製する。いずれかのかかる抗体について予想されるとおり、SDS-PAGEによって、優勢な蛋白質生産物は、非還元条件下で約150k dに移動し、50 および25k dの2つのバンドが還元条件下で現れた。CHO細胞において生産された抗体の場合、SDS-PAGEによる判断によると純度は>90%であり、濃度はアミノ酸分析によって正確に決定された。

[0095]

実施例5:G1-1 mABの組換えF蛋白質への結合

N H_2 S O_4 の添加によって反応を止め、Biotek ELISAリーダーを用いて吸光度を 450 n m で記録した。

[0096]

 $G\lambda-1$ mABの抗原結合エピトープを競合ELISAにおいて試験した。 $G\lambda-1$ mABは、高濃度のRSMU19またはB4、2つの強力な中和mAb(Tempestら、Biotech., 9: 266-271 (1991); Kennedyら、J. Gen. Virol., 69: 3023-3032 (1988))と混合し、F蛋白質被覆ウェルに加えた。Abrizaら、J. Gen. Virol., 73: 2225-2234 (1992)において以前に記載されたように、mAbRSMU19およびB4によって認識されるエピトープ領域は互いに全く別個である。競合研究において使用された $G\lambda-1$ mABの濃度は、F抗原に対して最大90%の結合を与えるように予め決定された。他のmABの存在下での $G\lambda-1$ mABの結合は、HRP標識化ヤギ抗ーヒトIgGを用いて検出された。反応は上記のように開始した。

[0097]

 $G\lambda-1$ mABは、ELISAによって組換え下(rF)蛋白質への強力な結合を明らかにした(mAB Bに対するEC $_{50}=2$. 6 n g/m1)。 $G\lambda-1$ mABのrF蛋白質への結合は、抗原認識に不可欠なF蛋白質アミノ酸が配列番号20のアミノ酸268、272 および275 であるmAb B4によって阻害された。 $G\lambda-1$ mABのrF蛋白質への結合は、配列番号20のF蛋白質アミノ酸429 が抗原認識に不可欠であるmAb RSMU19によって阻害されなかった。これらの結果は、F蛋白質(配列番号20)のアミノ酸255-275 の領域における残基が $G\lambda-1$ mAB認識に不可欠であることを示す。

[0098]

実施例6:G λ-1 mABのイン・ビトロ融合-阻害活性

 $G\lambda-1$ mABのウイルス誘導性細胞融合を阻害する能力は、イン・ビトロでの微量中和アッセイ(Beelerら、J. Virol., 63: 2941-2950(1989))の修飾を用いて決定された。該アッセイにおいて、 50μ 1のRS Long系統ウイルス(10-100 TCID₅₀/ウェル(American Type Culture Collection AT CC VR-26))を 2%ウシ胎児血清(FCS)を含有する最少必須培地(MEM)

中において、37 \mathbb{C} 、5 % \mathbb{C} \mathbb{O}_2 で 4 時間 \mathbb{O}_2 . 1 m \mathbb{O}_2 で \mathbb{O}_3 / \mathbb{O}_2 かいで、 \mathbb{O}_3 人力ェル)(ATCC CCL-81)と混合した。次いで、 \mathbb{O}_4 かいで、 \mathbb{O}_4 の連続的な \mathbb{O}_4 倍元 を \mathbb{O}_4 で \mathbb{O}_4 がいる。 対照培養物は、 ウイルスのみでインキュベートした細胞(陽性ウイルス対照)または培地のみでインキュベートした細胞を含有した。

[0099]

培養物を37℃で5%CO $_2$ 中において6日間インキュベートし、そのとき、ウイルス対照ウェル中の細胞病理学的効果(CPE)は>90%であった。細胞病理学的効果の顕微鏡試験は、ELISAによって確認された。培地を培養物から吸引し、 50μ 1の0. 6%H $_2$ O $_2$ を含有する90%メタノールで置換した。10分後、固定液を吸引し、プレートを一晩風乾した。 1μ g/mlのビオチン化RSCHB4(ウシB4mAbのヒトFc誘導体(SmithKline Beecham))、次いで、1:10000希釈したHRPー標識化ストレプトアビジン(Boehringer-Mannheim)を用いて、ウイルス性抗原を固定した培養物中において検出した。TMB1ueを用いて反応を開始し、1NH $_2$ SO $_4$ の添加によって止めた。450nmの吸光度を測定した(O.D. $_{450}$)。

[0100]

融合-阻害力価は、ウイルス対照と比べてELISAシグナルにおいて50%減少を引き起こした抗体濃度(ED_{50})として定義付された。標準的なウイルス滴定によるELISAにおいて作成された曲線に基づいて、 $O.D._{450}$ における50%減少はウイルス力価における $\ge 90\%$ 減少に相当した。50%点の計算は、用量滴定の回帰分析に基づいた。

 $G\lambda-1$ mABは、A型RS Long系統ウイルスに対する強力なイン・ビトロ融合—阻害活性を明らかにした(mAB BのED₅₀は、0.51±0.38 μ g/ml)。該イン・ビトロ融合—阻害アッセイにおいて、 $G\lambda-1$ mABBは、比較アッセイにおけるヒト化mABRSHZ19(0.4-3.0 μ g/mlのED₅₀)(Wydeら、Pediatr. Res., 38(4):543-550)より活性であった。

[0101]

実施例 $7: G \lambda - 1 mAB B の イン・ビボ活性: Balb/cマウスモデル における予防および治療$

ヒトRSVのA2系統の 10^5 PFUの鼻腔内感染の24時間前(予防)または4日後(治療)のいずれかに、0.06 mg/kg ~ 5 mg/kg範囲の $G\lambda$ -1 mAB BをBalb/cマウス(5/群)に腹腔内接種した。マウスを感染5日後に殺した。肺を採取し、ホモジナイズしてウイルス力価を決定した。

ウイルスは、予防的または治療的に ≥ 1 . $25\,\mathrm{mg/kg}$ $\mathrm{G}\,\lambda - 1$ mAB Bで予防的処理を行ったマウスの肺において検出されなかった。下記の表 I I を参照のこと。有意なウイルスのクリアランス($2-3\log_{10}$)もまた、0. $31\,\mathrm{mg/kg}$ $\mathrm{G}\,\lambda - 1\,\mathrm{mAB}$ Bを予防的または治療的に受けた動物において達成された。

[0102]

【表 2 】

表II:Balb/cマウスにおけるGλ-1mAB B予防および治療

	用量	肺ウイルス力価 (log _{1 o}	/g 肺)
処理	(mg/kg)	予防	<u>治療</u>
Gλ-1 mAB B	5	<1.7	<1.7
	1.25	<1.7	<1.7
	0.31	1.8 ± 0.3	2.9 ± 0.4
	0.06	4.3 ± 0.7	$4.5~\pm~0.3$
PBS	-	4.8 ± 0.7	4.7 ± 0.2

[0103]

 $G\lambda-1$ mABは、AおよびB型の両方の幅広い範囲の天然RSV単離株に対するイン・ビトロにおける強力な抗ウイルス活性を有し、動物モデルにおいて

イン・ビボで予防的および治療的効力を示す。したがって、 $G\lambda-1$ mABは、ヒトにおける治療的、予防的および診断的適用の候補である。

本明細書に記載された発明を考慮して、本発明の多くの修飾および変更が当業者によって施されうる。かかる修飾は、本発明の明細書および請求の範囲によって包含されると確信する。上記の全ての引用文献は、出典明示により本明細書の一部とされる。

【配列表】

SEQUENCE LISTING

(1) GENER	RAL INFORMATION:	
(i)	APPLICANT: SmithKline Beecham, PLC	
(ii)	TITLE OF INVENTION: Human Monoclonal Antibody	
(iii)	NUMBER OF SEQUENCES: 21	
(iv)	CORRESPONDENCE ADDRESS: (A) ADDRESSEE: SmithKline Beecham Corporation (B) STREET: 709 Swedeland Road (C) CITY: King of Prussia (D) STATE: PA (E) COUNTRY: USA (F) ZIP: 19406-2799	
(v)	COMPUTER READABLE FORM: (A) MEDIUM TYPE: Floppy disk (B) COMPUTER: IBM PC compatible (C) OPERATING SYSTEM: PC-DOS/MS-DOS (D) SOFTWARE: PatentIn Release #1.0, Version #1.30	
(vi)	CURRENT APPLICATION DATA: (A) APPLICATION NUMBER: GB (B) FILING DATE: (C) CLASSIFICATION:	
(viii)	ATTORNEY/AGENT INFORMATION: (A) NAME: King, William T. (B) REGISTRATION NUMBER: 30,954 (C) REFERENCE/DOCKET NUMBER: #	
(ix)	TELECOMMUNICATION INFORMATION: (A) TELEPHONE: 610-270-4800 (B) TELEFAX: 610-270-4026	
(2) INFOF	RMATION FOR SEQ ID NO:1:	
(i)	SEQUENCE CHARACTERISTICS: (A) LENGTH: 336 base pairs (B) TYPE: nucleic acid (C) STRANDEDNESS: double (D) TOPOLOGY: unknown	
(ii)	MOLECULE TYPE: cDNA	
(ix)	FEATURE: (A) NAME/KEY: CDS (B) LOCATION: 1336	
(xi)	SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:1:	
CAG TCT G Gln Ser V 1	erg Trg Acg cAg ccg ccc TcA GTC TcT Gcg Gcc ccA GGA CAG /al Leu Thr Gin Pro Pro Ser Val Ser Ala Ala Pro Gly Gin 5 10	4

AAG GTC ACC ATC TCC TGC ACT GGG AGC AGC TCC AAC CTC GGG GCA GGT 96

Lys	Val	Thr	Ile 20	Ser	Cys	Thr	Gly	Ser 25	Ser	Ser	Asn	Leu	Gly 30	Ala	Gly	
			CAC His													144
			GAT Asp													192
			AAG Lys													240
			GAT Asp													288
			TAT Tyr 100													336

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:2:

- (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 112 amino acids (B) TYPE: amino acid

 - (D) TOPOLOGY: linear
- (ii) MOLECULE TYPE: protein
- (xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:2;

Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Ala Ala Pro Gly Gln $\frac{1}{1}$

Lys Val Thr Ile Ser Cys Thr Gly Ser Ser Ser Asn Leu Gly Ala Gly 20 25 30

Tyr Asp Val His Trp Tyr Arg Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu $35 \hspace{1.5cm} 40 \hspace{1.5cm} 45$

Leu Ile Tyr Asp Asn Asn Asn Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe

Ser Gly Ser Lys Ser Gly Pro Ser Ala Ser Leu Ala Ile Ser Gly Leu 65 70 75 80

Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ser Tyr Asp Ser Ser 90 95

Leu Asn Gly Tyr Val Phe Gly Thr Gly Thr Gln Leu Thr Val Leu Gly 100 105 110

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:3:

- (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 357 base pairs (B) TYPE: nucleic acid

 - (C) STRANDEDNESS: double

	(ii) MO:	LECU	LE Ţ	YPE:	cDN	A									
	(ix		A) N.	AME/	KEY: ION:											
	(xi) SE	QUEN:	CE D	ESCR	IPTI	ON:	SEQ :	ID N	0:3:						
								GGA Gly								4
								TCT Ser 25								9.
								CCA Pro								14
								TAC Tyr								19:
								GAC Asp								24
								GAG Glu								28
								CCT Pro 105								336
					TCC Ser											351
(2)	INFO	RMAT	CION	FOR	SEQ	ID 1	NO:4:	:								
	4	(i) S	(A)	LEI TYI	IGTH: PE: 8	119 umino				3						
	(i	.i) M	10LEC	ULE	TYPE	l: pi	rotei	In								
	k)	i) S	EQUE	NCE	DESC	RIPT	: NOL	SEÇ] ID	NO:4	ł :					
Glu 1	Val	Gln	Leu	Val 5	Glu	Ser	Gly	Gly	Gly 10	Leu	Val	Gln	Pro	Gly 15	Gly	

(D) TOPOLOGY: unknown

Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Val Ser Leu Ser Gly Tyr 20 25 30

Lys Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val

35 40 45

Ser Ser Ile Thr Gly Met Ser Asn Tyr Ile His Tyr Ser Asp Ser Val 50 60

Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Met Asn Ser Leu Tyr 65 70 75 80

Leu Gln Met Asn Ser Leu Thr Ala Glu Asp Thr Gly Val Tyr Tyr Cys $85 \\ 90 \\ 95$

Ala Thr Gln Pro Gly Glu Leu Ala Pro Phe Asp His Trp Gly Gln Gly 100 \$100\$

Thr Leu Val Thr Val Ser Ser 115

- (2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:5:
 - (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 119 amino acids
 - (B) TYPE: amino acid
 - (C) STRANDEDNESS:
 (D) TOPOLOGY: linear
 - (ii) MOLECULE TYPE: protein
 - (xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:5:

Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly 1 5 15

Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Val Ser Leu Ser Gly Tyr 20 25 30

Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Met Asn Ser Leu Tyr $65 7075$

Leu Gln Met Asn Ser Leu Thr Ala Glu Asp Thr Gly Val Tyr Tyr Cys 85 90 95

Ala Thr Gln Pro Gly Glu Leu Ala Pro Phe Asp His Trp Gly Gln Gly 100 105 110

Thr Leu Val Thr Val Ser Ser 115

- (2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:6:
 - (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 98 amino acids
 - (B) TYPE: amino acid
 - (C) STRANDEDNESS:
 - (D) TOPOLOGY: linear

(ii) MOLECULE TYPE: protein

- (xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:6:
- Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly 1 5 10 15
- Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr $20 \\ 25 \\ 30$
- Glu Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val \$35\$
- Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr 65 70 75
- Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys 85 90 95

Ala Arg

- (2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:7:
 - (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 138 amino acids
 - (B) TYPE: amino acid
 - (C) STRANDEDNESS:
 - (D) TOPOLOGY: linear
 - (ii) MOLECULE TYPE: protein
 - (xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:7:

 - Val His Ser Glu Val Gln Leu Leu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln
 25 30
 - Pro Gly Gly Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Val Ser Leu 35 40 45
 - Ser Gly Tyr Lys Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu 50 60
 - Glu Trp Val Ser Ser Ile Thr Gly Met Ser Asn Tyr Ile His Tyr Ser 65 70 75
 - Asp Ser Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Met Asn $90\,$ 95
 - Ser Leu Tyr Leu Gln Met Asn Ser Leu Thr Ala Glu Asp Thr Gly Val

100 105 110

Tyr Tyr Cys Ala Thr Gln Pro Gly Glu Leu Ala Pro Phe Asp His Trp \$115\$ \$120\$ \$125

Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser 130 135

- (2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:8:
 - (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 138 amino acids
 - (B) TYPE: amino acid (C) STRANDEDNESS:
 - (D) TOPOLOGY: linear
 - (ii) MOLECULE TYPE: peptide
 - (xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:8:

Val His Ser Glu Val Gl
n Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gl
n 25 $$ 30

Pro Gly Gly Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Val Ser Leu 35 40 45

Ser Gly Tyr Lys Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu 50 60

Glu Trp Val Ser Ser Ile Thr Gly Met Ser Asn Tyr Ile His Tyr Ser 65 70 80

Asp Ser Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Met Asn 85 90

Tyr Tyr Cys Ala Thr Gln Pro Gly Glu Leu Ala Pro Phe Asp His Trp \$115\$ \$120\$ \$125\$

Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser 130

- (2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:9:
 - (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 111 amino acids
 - (B) TYPE: amino acid
 - (C) STRANDEDNESS:
 - (D) TOPOLOGY: unknown
 - (ii) MOLECULE TYPE: protein

- (xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:9:
- Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Ala Ala Pro Gly Gln $1 \hspace{1cm} 5 \hspace{1cm} 10 \hspace{1cm} 15$
- Lys Val Thr Ile Ser Cys Thr Gly Ser Ser Ser Asn Leu Gly Ala Gly $20 \\ 25 \\ 30 \\$
- Tyr Asp Val His Trp Tyr Arg Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu 35 40 45
- Leu Ile Tyr Asp Asn Asn Asn Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe 50 60
- Ser Gly Ser Lys Ser Gly Pro Ser Ala Ser Leu Ala Ile Ser Gly Leu 65 70 75 80
- Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ser Tyr Asp Ser Ser 85 90 95
- (2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:10:
 - (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 90 amino acids
 - (B) TYPE: amino acid
 - (C) STRANDEDNESS:
 - (D) TOPOLOGY: unknown
 - (ii) MOLECULE TYPE: protein
 - (xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:10:

 - Arg Val Thr Ile Ser Cys Thr Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ala Gly 20 25 30
 - Tyr Asp Val His Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu 35 45
 - Leu Ile Tyr Gly Asn Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe 50 55 60
 - Ser Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Thr Gly Leu 65 70 75 80
 - Glm Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys 85
- (2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:11:
 - (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 128 amino acids
 - (B) TYPE: amino acid
 - (C) STRANDEDNESS:
 - (D) TOPOLOGY: unknown

(ii) MOLECULE TYPE: protein

- (xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:11:
- Met Gly Trp Ser Cys Ile Ile Leu Phe Leu Val Ala Thr Ala Thr Gly $1 \ \ \,$ 10 $15 \ \ \,$
- Val His Ser Glu Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Gly Ala Pro Gly $20 \\ 25 \\ 30$
- Gln Arg Val Thr Ile Ser Cys Thr Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ala 35 40 45
- Gly Tyr Asp Val His Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys 50 60
- Leu Leu Ile Tyr Gly Asn Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg 65 70 75 80
- Phe Ser Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Thr Gly 85 90 95
- Leu Gl
n Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gl
n Ser Tyr Asp Ser 100 105 110
- Ser Leu Asn Gly Tyr Val Phe Gly Thr Gly Thr Gln Leu Thr Val Leu 115 120 125

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:12:

- (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 130 amino acids
 - (B) TYPE: amino acid
 - (C) STRANDEDNESS:
 - (D) TOPOLOGY: unknown
- (ii) MOLECULE TYPE: protein
- (xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:12:

- Pro Gly Gln Arg Val Thr Ile Ser Cys Thr Gly Ser Ser Asn Ile 35 40 45
- Gly Ala Gly Tyr Asp Val His Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala 50 60
- Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Gly Asn Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Pro 65 70 75 80

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile 85 90 95

Thr Gly Leu Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ser Tyr 100 105 110

Asp Ser Ser Leu Asn Gly Tyr Val Phe Gly Thr Gly Thr Gln Leu Thr 115 120 125

Val Leu 130

- (2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:13:
 - (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 6281 base pairs
 - (B) TYPE: nucleic acid
 - (C) STRANDEDNESS: double
 - (D) TOPOLOGY: unknown
 - (ii) MOLECULE TYPE: cDNA

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:13:

GACGTCGCGG CCGCTCTAGG CCTCCAAAAA AGCCTCCTCA CTACTTCTGG AATAGCTCAG 60 AGGCCGAGGC GGCCTCGGCC TCTGCATAAA TAAAAAAAAT TAGTCAGCCA TGCATGGGGC 120 GGAGAATGGG CGGAACTGGG CGGAGTTAGG GCCGGGATGG GCGGAGTTAG GGGCGGGACT 180 ATGCTTGCTG ACTAATTGAG ATGCATGCTT TGCATACTTC TGCCTGCTGG GGAGCCTGGG 240 GACTTTCCAC ACCTGGTTGC TGACTAATTG AGATGCATGC TTTGCATACT TCTGCCTGCT 300 GGGGAGCCTG GGGACTTTCC ACACCCTAAC TGACACACAT TCCACAGAAT TAATTCCCGG 360 GGATCGATCC GTCGACGTAC GACTAGTTAT TAATAGTAAT CAATTACGGG GTCATTAGTT 420 CATAGCCCAT ATATGGAGTT CCGCGTTACA TAACTTACGG TAAATGGCCC GCCTGGCTGA 480 CCGCCCAACG ACCCCCGCCC ATTGACGTCA ATAATGACGT ATGTTCCCAT AGTAACGCCA 540 ATAGGGACTT TCCATTGACG TCAATGGGTG GACTATTTAC GGTAAACTGC CCACTTGGCA 600 GTACATCAAG TGTATCATAT GCCAAGTACG CCCCCTATTG ACGTCAATGA CGGTAAATGG 660 CCCGCCTGGC ATTATGCCCA GTACATGACC TTATGGGACT TTCCTACTTG GCAGTACATC 720 TACGTATTAG TCATCGCTAT TACCATGGTG ATGCGGTTTT GGCAGTACAT CAATGGGCGT 780 GGATAGCGGT TTGACTCACB GGGATTTCCA AGTCTCCACC CCATTGACGT CAATGGGAGT 840 TTGTTTTGGC ACCAAAATCA ACGGGACTTT CCAAAATGTC GTAACAACTC CGCCCCATTG 900 ACGCAAATGG GCGGTAGGCG TGTACGGTGG GAGGTCTATA TAAGCAGAGC TGGGTACGTG 960 AACCGTCAGA TCGCCTGGAG ACGCCATCGA ATTCTGAGCA CACAGGACCT CACCATGGGA 1020 TGGAGCTGTA TCATCCTCTT CTTGGTAGCA ACAGCTACAG GTGTCCACTC CGAGGTCCAA 1080

CTGCTCGAGI	CTGGGGGAGG	CTTGGTACAG	CCTGGGGGGT	CCCTGAGACT	CTCCTGCGCA	1140
GCCTCTGGAG	TCTCCCTCAG	TGGATACAAG	ATGAACTGGG	TCCGCCAGGC	TCCAGGGAAG	1200
GGGCTGGAAT	GGGTCTCTTC	CATTACTGGT	ATGAGTAATT	ACATACACTA	CTCAGACTCA	1260
GTGAAGGGCC	GATTCACCAT	CTCCAGAGAC	AACGCCATGA	ACTCACTGTA	TCTGCAAATG	1320
AACAGCCTGA	CAGCCGAGGA	CACGGGTGTT	TATTATTGTG	CGACACAACC	GGGGGAGCTG	1380
GCGCCTTTTG	ACCATTGGGG	CCAGGGAACC	CTGGTCACCG	TCTCCTCAGC	CTCCACCAAG	1440
GGCCCATCGG	TCTTCCCCCT	GGCACCCTCC	TCCAAGAGCA	CCTCTGGGGG	CACAGCGGCC	1500
CTGGGCTGCC	TGGTCAAGGA	CTACTTCCCC	GAACCGGTGA	CGGTGTCGTG	GAACTCAGGC	1560
GCCCTGACCA	GCGGCGTGCA	CACCTTCCCG	GCTGTCCTAC	AGTCCTCAGG	ACTCTACTCC	1620
CTCAGCAGCG	TGGTGACCGT	GCCCTCCAGC	AGCTTGGGCA	CCCAGACCTA	CATCTGCAAC	1680
GTGAATCACA	AGCCCAGCAA	CACCAAGGTG	GACAAGAAAG	TTGAGCCCAA	ATCTTGTGAC	1740
AAAACTCACA	CATGCCCACC	GTGCCCAGCA	CCTGAACTCC	TGGGGGGACC	GTCAGTCTTC	1800
стеттеессе	CAAAACCCAA	GGACACCCTC	ATGATCTCCC	GGACCCCTGA	GGTCACATGC	1860
GTGGTGGTGG	ACGTGAGCCA	CGAAGACCCT	GAGGTCAAGT	TCAACTGGTA	CGTGGACGGC	1920
GTGGAGGTGC	ATAATGCCAA	GACAAAGCCG	CGGGAGGAGC	AGTACAACAG	CACGTACCGG	1980
GTGGTCAGCG	TCCTCACCGT	CCTGCACCAG	GACTGGCTGA	ATGGCAAGGA	GTACAAGTGC	2040
AAGGTCTCCA	ACAAAGCCCT	CCCAGCCCCC	ATCGAGAAAA	CCATCTCCAA	AGCCAAAGGG	2100
CAGCCCCGAG	AACCACAGGT	GTACACCCTG	CCCCCATCCC	GGGATGAGCT	GACCAAGAAC	2160
CAGGTCAGCC	TGACCTGCCT	GGTCAAAGGC	TTCTATCCCA	GCGACATCGC	CGTGGAGTGG	2220
GAGAGCAATG	GGCAGCCGGA	GAACAACTAC	AAGACCACGC	CTCCCGTGCT	GGACTCCGAC	2280
GGCTCCTTCT	TCCTCTACAG	CAAGCTCACC	GTGGACAAGA	GCAGGTGGCA	GCAGGGGAAC	2340
GTCTTCTCAT	GCTCCGTGAT	GCATGAGGCT	CTGCACAACC	ACTACACGCA	GAAGAGCCTC	2400
TCCCTGTCTC	CGGGTAAATG	ATAGATATCT	ACGTATGATC	AGCCTCGACT	GTGCCTTCTA	2460
GTTGCCAGCC	ATCTGTTGTT	TGCCCCTCCC	CCGTGCCTTC	CTTGACCCTG	GAAGGTGCCA	2520
CTCCCACTGT	CCTTTCCTAA	TAAAATGAGG	AAATTGCATC	GCATTGTCTG	AGTAGGTGTC	2580
ATTCTATTCT	GGGGGTGGG	GTGGGGCAGG	ACAGCAAGGG	GGAGGATTGG	GAAGACAATA	2640
GCAGGCATGC	TGGGGATGCG	GTGGGCTCTA	TGGAACCAGC	TGGGGCTCGA	CAGCGCTGGA	2700
TCTCCCGATC	CCCAGCTTTG	CTTCTCAATT	TCTTATTTGC	ATAATGAGAA	AAAAAGGAAA	2760
ATTAATTTTA	ACACCAATTC	AGTAGTTGAT	TGAGCAAATG	CGTTGCCAAA	AAGGATGCTT	2820
TAGAGACAGT	GTTCTCTGCA	CAGATAAGGA	CAAACATTAT	TCAGAGGGAG	TACCCAGAGC	2880
TGAGACTCCT	AAGCCAGTGA	GTGGCACAGC	ATTCTAGGGA	GAAATATGCT	TGTCATCACC	2940
GAAGCCTGAT	TCCGTAGAGC	CACACCTTGG	TAAGGGCCAA	TCTGCTCACA	CAGGATAGAG	3000

AGGGCAGGAG CCAGGGCAGA	GCATATAAGG	TGAGGTAGGA	TCAGTTGCTC	CTCACATTTG	3060
CTTCTGACAT AGTTGTGTTG	GGAGCTTGGA	TAGCTTGGAC	AGCTCAGGGC	TGCGATTTCG	3120
CGCCAAACTT GACGGCAATC	CTAGCGTGAA	GGCTGGTAGG	ATTTTATCCC	CGCTGCCATC	3180
ATGGTTCGAC CATTGAACTG	CATCGTCGCC	GTGTCCCAAA	ATATGGGGAT	TGGCAAGAAC	3240
GGAGACCTAC CCTGGCCTCC	GCTCAGGAAC	GAGTTCAAGT	ACTTCCAAAG	AATGACCACA	3300
ACCTCTTCAG TGGAAGGTAA	ACAGAATCTG	GTGATTATGG	GTAGGAAAAC	CTGGTTCTCC	3360
ATTCCTGAGA AGAATCGACC	TTTAAAGGAC	AGAATTAATA	TAGTTCTCAG	TAGAGAACTC	3420
AAAGAACCAC CACGAGGAGC	TCATTTTCTT	GCCAAAAGTT	TGGATGATGC	CTTAAGACTT	3480
ATTGAACAAC CGGAATTGGC	AAGTAAAGTA	GACATGGTTT	GGATAGTCGG	AGGCAGTTCT	3540
GTTTACCAGG AAGCCATGAA	TCAACCAGGC	CACCTTAGAC	TCTTTGTGAC	AAGGATCATG	3600
CAGGAATTTG AAAGTGACAC	GTTTTTCCCA	GAAATTGATT	TGGGGAAATA	TAAACTTCTC	3660
CCAGAATACC CAGGCGTCCT	CTCTGAGGTC	CAGGAGGAAA	AAGGCATCAA	GTATAAGTTT	3720
GAAGTCTACG AGAAGAAAGA	CTAACAGGAA	GATGCTTTCA	AGTTCTCTGC	TCCCCTCCTA	3780
AAGCTATGCA TTTTTATAAG	ACCATGGGAC	TTTTGCTGGC	TTTAGATCAG	CCTCGACTGT	3840
GCCTTCTAGT TGCCAGCCAT	CTGTTGTTTG	CCCCTCCCCC	GTGCCTTCCT	TGACCCTGGA	3900
AGGTGCCACT CCCACTGTCC	TTTCCTAATA	AAATGAGGAA	ATTGCATCGC	ATTGTCTGAG	3960
TAGGTGTCAT TCTATTCTGG	GGGGTGGGGT	GGGCAGGAC	AGCAAGGGGG	AGGATTGGGA	4020
AGACAATAGC AGGCATGCTG	GGGATGCGGT	GGGCTCTATG	GAACCAGCTG	GGGCTCGATC	4080
GAGTGTATGA CTGCGGCCGC	GATCCCGTCG	AGAGCTTGGC	GTAATCATGG	TCATAGCTGT	4140
TTCCTGTGTG AAATTGTTAT	CCGCTCACAA	TTCCACACAA	CATACGAGCC	GGAAGCATAA	4200
AGTGTAAAGC CTGGGGTGCC	TAATGAGTGA	GCTAACTCAC	ATTAATTGCG	TTGCGCTCAC	4260
TGCCCGCTTT CCAGTCGGGA	AACCTGTCGT	GCCAGCTGCA	TTAATGAATC	GGCCAACGCG	4320
CGGGGAGAGG CGGTTTGCGT	ATTGGGCGCT	CTTCCGCTTC	CTCGCTCACT	GACTCGCTGC	4380
GCTCGGTCGT TCGGCTGCGG	CGAGCGGTAT	CAGCTCACTC	AAAGGCGGTA	ATACGGTTAT	4440
CCACAGAATC AGGGGATAAC	GCAGGAAAGA	ACATGTGAGC	AAAAGGCCAG	CAAAAGGCCA	4500
GGAACCGTAA AAAGGCCGCG	TTGCTGGCGT	TTTTCCATAG	GCTCCGCCCC	CCTGACGAGC	4560
ATCACAAAAA TCGACGCTCA	AGTCAGAGGT	GGCGAAACCC	GACAGGACTA	TAAAGATACC	4620
AGGCGTTTCC CCCTGGAAGC	TOCCTOGTGO	GCTCTCCTGT	TCCGACCCTG	CCGCTTACCG	4680
GATACCTGTC CGCCTTTCTC	CCTTCGGGAA	GCGTGGCGCT	TTCTCAATGC	TCACGCTGTA	4740
GGTATCTCAG TTCGGTGTAG	GTCGTTCGCT	CCAAGCTGGG	CTGTGTGCAC	GAACCCCCCG	4800
TTCAGCCCGA CCGCTGCGCC	TTATCCGGTA	ACTATCGTCT	TGAGTCCAAC	CCGGTAAGAC	4860

ACGACTTATC	GCCACTGGCA	GCAGCCACTG	GTAACAGGAT	TAGCAGAGCG	AGGTATGTAG	4920
GCGGTGCTAC	AGAGTTCTTG	AAGTGGTGGC	CTAACTACGG	CTACACTAGA	AGGACAGTAT	4980
TTGGTATCTG	CGCTCTGCTG	AAGCCAGTTA	CCTTCGGAAA	AAGAGTTGGT	AGCTCTTGAT	5040
CCGGCAAACA	AACCACCGCT	GGTAGCGGTG	GTTTTTTTGT	TTGCAAGCAG	CAGATTACGC	5100
GCAGAAAAA	AGGATCTCAA	GAAGATCCTT	TGATCTTTTC	TACGGGGTCT	GACGCTCAGT	5160
GGAACGAAAA	CTCACGTTAA	GGGATTTTGG	TCATGAGATT	ATCAAAAAGG	ATCTTCACCT	5220
AGATCCTTTT	AAATTAAAA	TGAAGTTTTA	AATCAATCTA	AAGTATATAŤ	GAGTAAACTT	5280
GGTCTGACAG	TTACCAATGC	TTAATCAGTG	AGGCACCTAT	CTCAGCGATC	TGTCTATTTC	5340
GTTCATCCAT	AGTTGCCTGA	CTCCCCGTCG	TGTAGATAAC	TACGATACGG	GAGGGCTTAC	5400
CATCTGGCCC	CAGTGCTGCA	ATGATACCGC	GAGACCCACG	CTCACCGGCT	CCAGATTTAT	5460
CAGCAATAAA	CCAGCCAGCC	GGAAGGGCCG	AGCGCAGAAG	TGGTCCTGCA	ACTTTATCCG	5520
CCTCCATCCA	GTCTATTAAT	TGTTGCCGGG	AAGCTAGAGT	AAGTAGTTCG	CCAGTTAATA	5580
GTTTGCGCAA	CGTTGTTGCC	ATTGCTACAG	GCATCGTGGT	GTCACGCTCG	TCGTTTGGTA	5640
TGGCTTCATT	CAGCTCCGGT	TCCCAACGAT	CAAGGCGAGT	TACATGATCC	CCCATGTTGT	5700
GCAAAAAAGC	GGTTAGCTCC	TTCGGTCCTC	CGATCGTTGT	CAGAAGTAAG	TTGGCCGCAG	5760
TGTTATCACT	CATGGTTATG	GCAGCACTGC	ATAATTCTCT	TACTGTCATG	CCATCCGTAA	5820
GATGCTTTTC	TGTGACTGGT	GAGTACTCAA	CCAAGTCATT	CTGAGAATAG	TGTATGCGGC	5880
GACCGAGTTG	CTCTTGCCCG	GCGTCAATAC	GGGATAATAC	CGCGCCACAT	AGCAGAACTT	5940
TAAAAGTGCT	CATCATTGGA	AAACGTTCTT	CGGGGCGAAA	ACTCTCAAGG	ATCTTACCGC	6000
TGTTGAGATC	CAGTTCGATG	TAACCCACTC	GTGCACCCAA	CTGATCTTCA	GCATCTTTTA	6060
CTTTCACCAG	CGTTTCTGGG	TGAGCAAAAA	CAGGAAGGCA	AAATGCCGCA	AAAAAGGGAA	6120
TAAGGGCGAC	ACGGAAATGT	TGAATACTCA	TACTCTTCCT	TTTTCAATAT	TATTGAAGCA	6180
TTTATCAGGG	TTATTGTCTC	ATGAGCGGAT	ACATATTTGA	ATGTATTTAG	AAAAATAAAC	6240
AAATAGGGGT	TOCGCGCACA	TTTCCCCGAA	AAGTGCCACC	T		6281

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:14:

- (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 (A) LENGTH: 5679 base pairs
 (B) TYPE: nucleic acid
 (C) STRANDEDNESS: double
 (D) TOPOLOGY: unknown
- (ii) MOLECULE TYPE: cDNA
- (xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:14:

GACGTCGCGG	CCGCTCTAGG	CCTCCAAAAA	AGCCTCCTCA	CTACTTCTGG	AATAGCTCAG	60
AGGCCGAGGC	GGCCTCGGCC	TCTGCATAAA	TAAAAAAAAT	TAGTCAGCCA	TGCATGGGGC	120
GGAGAATGGG	CGGAACTGGG	CGGAGTTAGG	GGCGGGATGG	GCGGAGTTAG	GGGCGGGACT	180
ATGGTTGCTG	ACTAATTGAG	ATGCATGCTT	TGCATACTTC	TGCCTGCTGG	GGAGCCTGGG	240
GACTTTCCAC	ACCTGGTTGC	TGACTAATTG	AGATGCATGC	TTTGCATACT	TCTGCCTGCT	300
GGGGAGCCTG	GGGACTTTCC	ACACCCTAAC	TGACACACAT	TCCACAGAAT	TAATTCCCGG	360
GGATCGATCC	GTCGACGTAC	GACTAGTTAT	TAATAGTAAT	CAATTACGGG	GTCATTAGTT	420
CATAGCCCAT	ATATGGAGTT	CCGCGTTACA	TAACTTACGG	TAAATGGCCC	GCCTGGCTGA	480
CCGCCCAACG	ACCCCCGCCC	ATTGACGTCA	ATAATGACGT	ATGTTCCCAT	AGTAACGCCA	540
ATAGGGACTT	TCCATTGACG	TCAATGGGTG	GACTATTTAC	GGTAAACTGC	CCACTTGGCA	600
GTACATCAAG	TGTATCATAT	GCCAAGTACG	CCCCCTATTG	ACGTCAATGA	CGGTAAATGG	660
CCCGCCTGGC	ATTATGCCCA	GTACATGACC	TTATGGGACT	TTCCTACTTG	GCAGTACATC	720
TACGTATTAG	TCATCGCTAT	TACCATGGTG	ATGCGGTTTT	GGCAGTACAT	CAATGGGCGT	780
GGATAGCGGT	TTGACTCACG	GGGATTTCCA	AGTCTCCACC	CCATTGACGT	CAATGGGAGT	840
TTGTTTTGGC	ACCAAAATCA	ACGGGACTTT	CCAAAATGTC	GTAACAACTC	CGCCCCATTG	900
ACGCAAATGG	GCGGTAGGCG	TGTACGGTGG	GAGGTCTATA	TAAGCAGAGC	TGGGTACGTG	960
AACCGTCAGA	TCGCCTGGAG	ACGCCATCGA	ATTCTGAGCA	CACAGGACCT	CACCATGGGA	1020
TGGAGCTGTA	TCATCCTCTT	CTTGGTAGCA	ACAGCTACAG	GTGTCCACTC	CGAGCTCACG	1080
CAGCCGCCCT	CAGTCTCTGC	GGCCCCAGGA	CAGAAGGTCA	CCATCTCCTG	CACTGGGAGC	1140
AGCTCCAACC	TCGGGGCAGG	TTATGATGTT	CACTGGTACC	GGCAACTTCC	AGGGACAGCC	1200
CCCAAACTCC	TCATCTATGA	TAACAACAAT	CGGCCCTCAG	GGGTCCCTGA	CCGATTCTCT	1260
GGCTCCAAGT	CTGGCCCCTC	AGCCTCCCTG	GCCATCTCTG	GGCTCCAGGC	TGAGGATGAG	1320
GCTGATTATT	ACTGCCAGTC	CTATGACAGC	AGCCTGAATG	GTTATGTCTT	CGGAACTGGG	1380
ACCCAGCTCA	CCGTCCTAGG	TCAGCCCAAG	GCTGCCCCCT	CGGTCACTCT	GTTCCCGCCC	1440
TCCTCTGAGG	AGCTTCAAGC	CAACAAGGCC	ACACTGGTGT	GTCTCATAAG	TGACTTCTAC	1500
CCGGGAGCCG	TGACAGTGGC	CTGGAAGGCA	ATTAGCAGCC	CCGTCAAGGC	GGGAGTGGAG	1560
ACCACCACAC	CCTCCAAACA	AAGCAACAAC	AAGTACGCGG	CCAGCAGCTA	TCTGAGCCTG	1620
ACGCCTGAGC	AGTGGAAGTC	CCACAGAAGG	TACAGCTGCC	AGGTCACGCA	TGAAGGGAGC	1680
ACCGTGGAGA	AGACAGTGGC	CCCTACAGAA	TGTTCATAGT	TCTAGATCTA	CGTATGATCA	1740
GCCTCGACTG	TGCCTTCTAG	TTGCCAGCCA	TCTGTTGTTT	GCCCCTCCCC	CGTGCCTTCC	1800
TTGACCCTGG	AAGGTGCCAC	TCCCACTGTC	CTTTCCTAAT	AAAATGAGGA	AATTGCATCG	1860
CATTGTCTGA	GTAGGTGTCA	TTCTATTCTG	GGGGGTGGGG	TGGGGCAGGA	CAGCAAGGGG	1920

GAGGATTGGG	AAGACAATAG	CAGGCATGCT	GGGGATGCGG	TGGGCTCTAT	GGAACCAGCT	1980
GGGGCTCGAC	AGCTCGAGCT	AGCTTTGCTT	CTCAATTTCT	TATTTGCATA	ATGAGAAAAA	2040
AAGGAAAATT	AATTTTAACA	CCAATTCAGT	AGTTGATTGA	GCAAATGCGT	TGCCAAAAAG	2100
GATGCTTTAG	AGACAGTGTT	CTCTGCACAG	ATAAGGACAA	ACATTATTCA	GAGGGAGTAC	2160
CCAGAGCTGA	GACTCCTAAG	CCAGTGAGTG	GCACAGCATT	CTAGGGAGAA	ATATGCTTGT	2220
CATCACCGAA	GCCTGATTCC	GTAGAGCCAC	ACCTTGGTAA	GGGCCAATCT	GCTCACACAG	2280
GATAGAGAGG	GCAGGAGCCA	GGGCAGAGCA	TATAAGGTGA	GGTAGGATCA	GTTGCTCCTC	2340
ACATTTGCTT	CTGACATAGT	TGTGTTGGGA	GCTTGGATCG	ATCCACCATG	GTTGAACAAG	2400
ATGGATTGCA	CGCAGGTTCT	CCGGCCGCTT	GGGTGGAGAG	GCTATTCGGC	TATGACTGGG	2460
CACAACAGAC	AATCGGCTGC	TCTGATGCCG	CCGTGTTCCG	GCTGTCAGCG	CAGGGGCGCC	2520
CGGTTCTTTT	TGTCAAGACC	GACCTGTCCG	GTGCCCTGAA	TGAACTGCAG	GACGAGGCAG	2580
CGCGGCTATC	GTGGCTGGCC	ACGACGGGCG	TTCCTTGCGC	AGCTGTGCTC	GACGTTGTCA	2640
CTGAAGCGGG	AAGGGACTGG	CTGCTATTGG	GCGAAGTGCC	GGGGCAGGAT	CTCCTGTCAT	2700
CTCACCTTGC	TCCTGCCGAG	AAAGTATCCA	TCATGGCTGA	TGCAATGCGG	CGGCTGCATA	2760
CGCTTGATCC	GGCTACCTGC	CCATTCGACC	ACCAAGCGAA	ACATCGCATC	GAGCGAGCAC	2820
GTACTCGGAT	GGAAGCCGGT	CTTGTCGATC	AGGATGATCT	GGACGAAGAG	CATCAGGGGC	2880
TCGCGCCAGC	CGAACTGTTC	GCCAGGCTCA	AGGCGCGCAT	GCCCGACGGC	GAGGATCTCG	2940
TCGTGACCCA	TGGCGATGCC	TGCTTGCCGA	ATATCATGGT	GGAAAATGGC	CGCTTTTCTG	3000
GATTCATCGA	CTGTGGCCGG	CTGGGTGTGG	CGGACCGCTA	TCAGGACATA	GCGTTGGCTA	3060
CCCGTGATAT	TGCTGAAGAG	CTTGGCGGCG	AATGGGCTGA	CCGCTTCCTC	GTGCTTTACG	3120
GTATCGCCGC	TCCCGATTCG	CAGCGCATCG	CCTTCTATCG	CCTTCTTGAC	GAGTTCTTCT	3180
GAGCGGGACT	CTGGGGTTCG	AAATGACCGA	CCAAGCGACG	CCCAACCTGC	CATCACGAGA	3240
TTTCGATTCC	ACCGCCGCCT	TCTATGAAAG	GTTGGGCTTC	GGAATCGTTT	TCCGGGACGC	3300
CGGCTGGATG	ATCCTCCAGC	GCGGGGATCT	CATGCTGGAG	TTCTTCGCCC	ACCCCAACTT	3360
GTTTATTGCA	GCTTATAATG	GTTACAAATA	AAGCAATAGC	ATCACAAATT	TCACAAATAA	3420
AGCATTTTT	TCACTGCATT	CTAGTTGTGG	TTTGTCCAAA	CTCATCAATG	TATCTTATCA	3480
TGTCTGGATC	GCGGCCGCGA	TCCCGTCGAG	AGCTTGGCGT	AATCATGGTC	ATAGCTGTTT	3540
CCTGTGTGAA	ATTGTTATCC	GCTCACAATT	CCACACAACA	TACGAGCCGG	AAGCATAAAG	3600
TGTAAAGCCT	GGGGTGCCTA	ATGAGTGAGC	TAACTCACAT	TAATTGCGTT	GCGCTCACTG	3660
CCCGCTTTCC .	AGTCGGGAAA	CCTGTCGTGC	CAGCTGCATT	AATGAATCGG	CCAACGCGCG	3720
GGGAGAGGCG	GTTTGCGTAT	TGGGCGCTCT	TCCGCTTCCT	CGCTCACTGA	CTCGCTGCGC	3780

TCGGTCGTTC	GGCTGCGGCG	AGCGGTATCA	GCTCACTCAA	AGGCGGTAAT	ACGGTTATCC	3840
ACAGAATCAG	GGGATAACGC	AGGAAAGAAC	ATGTGAGCAA	AAGGCCAGCA	AAAGGCCAGG	3900
AACCGTAAAA	AGGCCGCGTT	GCTGGCGTTT	TTCCATAGGC	TCCGCCCCCC	TGACGAGCAT	3960
CACAAAAATC	GACGCTCAAG	TCAGAGGTGG	CGAAACCCGA	CAGGACTATA	AAGATACCAG	4020
GCGTTTCCCC	CTGGAAGCTC	CCTCGTGCGC	TCTCCTGTTC	CGACCCTGCC	GCTTACCGGA	4080
TACCTGTCCG	CCTTTCTCCC	TTCGGGAAGC	GTGGCGCTTT	CTCAATGCTC	ACGCTGTAGG	4140
TATCTCAGTT	CGGTGTAGGT	CGTTCGCTCC	AAGCTGGGCT	GTGTGCACGA	ACCCCCCGTT	4200
CAGCCCGACC	GCTGCGCCTT	ATCCGGTAAC	TATCGTCTTG	AGTCCAACCC	GGTAAGACAC	4260
GACTTATCGC	CACTGGCAGC	AGCCACTGGT	AACAGGATTA	GCAGAGCGAG	GTATGTAGGC	4320
GGTGCTACAG	AGTTCTTGAA	GTGGTGGCCT	AACTACGGCT	ACACTAGAAG	GACAGTATTT	4380
GGTATCTGCG	CTCTGCTGAA	GCCAGTTACC	TTCGGAAAAA	GAGTTGGTAG	CTCTTGATCC	4440
GGCAAACAAA	CCACCGCTGG	TAGCGGTGGT	TTTTTTTTTT	GCAAGCAGCA	GATTACGCGC	4500
AGAAAAAAAG	GATCTCAAGA	AGATCCTTTG	ATCTTTTCTA	CGGGGTCTGA	CGCTCAGTGG	4560
AACGAAAACT	CACGTTAAGG	GATTTTGGTC	ATGAGATTAT	CAAAAAGGAT	CTTCACCTAG	4620
ATCCTTTTAA	ATTAAAAATG	AAGTTTTAAA	TCAATCTAAA	GTATATATGA	GTAAACTTGG	4680
TCTGACAGTT	ACCAATGCTT	AATCAGTGAG	GCACCTATCT	CAGCGATCTG	TCTATTTCGT	4740
TCATCCATAG	TTGCCTGACT	CCCCGTCGTG	TAGATAACTA	CGATACGGGA	GGGCTTACCA	4800
TCTGGCCCCA	GTGCTGCAAT	GATACCGCGA	GACCCACGCT	CACCGGCTCC	AGATTTATCA	4860
GCAATAAACC	AGCCAGCCGG	AAGGGCCGAG	CGCAGAAGTG	GTCCTGCAAC	TTTATCCGCC	4920
TCCATCCAGT	CTATTAATTG	TTGCCGGGAA	GCTAGAGTAA	GTAGTTCGCC	AGTTAATAGT	4980
TTGCGCAACG	TTGTTGCCAT	TGCTACAGGC	ATCGTGGTGT	CACGCTCGTC	GTTTGGTATG	5040
GCTTCATTCA	GCTCCGGTTC	CCAACGATCA	AGGCGAGTTA	CATGATCCCC	CATGTTGTGC	5100
AAAAAGCGG	TTAGCTCCTT	CGGTCCTCCG	ATCGTTGTCA	GAAGTAAGTT	GGCCGCAGTG	5160
TTATCACTCA	TGGTTATGGC	AGCACTGCAT	AATTCTCTTA	CTGTCATGCC	ATCCGT AAG A	5220
TGCTTTTCTG	TGACTGGTGA	GTACTCAACC	AAGTCATTCT	GAGAATAGTG	TATGCGGCGA	5280
CCGAGTTGCT	CTTGCCCGGC	GTCAATACGG	GATAATACCG	CGCCACATAG	CAGAACTTTA	5340
AAAGTGCTCA	TCATTGGAAA	ACGTTCTTCG	GGGCGAAAAC	TCTCAAGGAT	CTTACCGCTG	5400
TTGAGATCCA	GTTCGATGTA	ACCCACTCGT	GCACCCAACT	GATCTTCAGC	ATCTTTTACT	5460
TTCACCAGCG	TTTCTGGGTG	AGCAAAAACA	GGAAGGCAAA	ATGCCGCAAA	AAAGGGAATA	5520
AGGCCGACAC	GGAAATGTTG	AATACTCATA	CTCTTCCTTT	TTCAATATTA	TTGAAGCATT	5580
TATCAGGGTT	ATTGTCTCAT	GAGCGGATAC	ATATTTGAAT	GTATTTAGAA	AAATAAACAA	5640
ATAGGGGTTC	CGCGCACATT	TCCCCGAAAA	GTGCCACCT			5679

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:15:

(i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:

(A) LENGTH: 1442 base pairs
(B) TYPE: nucleic acid
(C) STRANDEDNESS: double
(D) TOPOLOGY: unknown

(ii) MOLECULE TYPE: cDNA

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:15:

GAATTCTGAG CACACAGGAG	CTCACCATGG	GATGGAGCTG	TATCATCCTC	TTCTTGGTAG	60
CAACAGCTAC AGGTGTCCAC	TCCGAGGTGC	AGCTGGTGGA	GTCTGGGGGA	GGCTTGGTAC	120
AGCCTGGGGG GTCCCTGAGA	CTCTCCTGCG	CAGCCTCTGG	AGTCTCCCTC	AGTGGATACA	180
AGATGAACTG GGTCCGCCAC	GCTCCAGGGA	AGGGGCTGGA	ATGGGTCTCT	TCCATTACTG	240
GTATGAGTAA TTACATACAC	TACTCAGACT	CAGTGAAGGG	CCGATTCACC	ATCTCCAGAG	300
ACAACGCCAT GAACTCACTC	TATCTGCAAA	TGAACAGCCT	GACAGCCGAG	GACACGGGTG	360
TTTATTATTG TGCGACACA	CCGGGGGAGC	TGGCGCCTTT	TGACCATTGG	GGCCAGGGAA	420
CCCTGGTCAC CGTCTCCTCA	GCCTCCACCA	AGGGCCCATC	GGTCTTCCCC	CTGGCACCCT	480
CCTCCAAGAG CACCTCTGGG	GGCACAGCGG	CCCTGGGCTG	CCTGGTCAAG	GACTACTTCC	540
CCGAACCGGT GACGGTGTCC	TGGAACTCAG	GCGCCCTGAC	CAGCGGCGTG	CACACCTTCC	600
CGGCTGTCCT ACAGTCCTCA	GGACTCTACT	CCCTCAGCAG	CGTGGTGACC	GTGCCCTCCA	660
GCAGCTTGGG CACCCAGACC	TACATCTGCA	ACGTGAATCA	CAAGCCCAGC	AACACCAAGG	720
TGGACAAGAA AGTTGAGCCC	AAATCTTGTG	ACAAAACTCA	CACATGCCCA	CCGTGCCCAG	780
CACCTGAACT CCTGGGGGGA	CCGTCAGTCT	TCCTCTTCCC	CCCAAAACCC	AAGGACACCC	840
TCATGATCTC CCGGACCCCT	GAGGTCACAT	GCGTGGTGGT	GGACGTGAGC	CACGAAGACC	900
CTGAGGTCAA GTTCAACTGG	TACGTGGACG	GCGTGGAGGT	GCATAATGCC	AAGACAAAGC	960
CGCGGGAGGA GCAGTACAAC	AGCACGTACC	GGGTGGTCAG	CGTCCTCACC	GTCCTGCACC	1020
AGGACTGGCT GAATGGCAAG	GAGTACAAGT	GCAAGGTCTC	CAACAAAGCC	CTCCCAGCCC	1080
CCATCGAGAA AACCATCTCC	AAAGCCAAAG	GGCAGCCCCG	AGAACCACAG	GTGTACACCC	1140
TGCCCCCATC CCGGGATGAG	CTGACCAAGA	ACCAGGTCAG	CCTGACCTGC	CTGGTCAAAG	1200
GCTTCTATCC CAGCGACATC	GCCGTGGAGT	GGGAGAGCAA	TGGGCAGCCG	GAGAACAACT	1260
ACAAGACCAC GCCTCCCGTG	CTGGACTCCG	ACGGCTCCTT	CTTCCTCTAC	AGCAAGCTCA	1320
CCGTGGACAA GAGCAGGTGG	CAGCAGGGGA	ACGTCTTCTC	ATGCTCCGTG	ATGCATGAGG	1380
CTCTGCACAA CCACTACACG	CAGAAGAGCC	TCTCCCTGTC	TCCGGGTAAA	TGATAGATAT	1440

СТ 1442

- (2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:16:
 - (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 762 base pairs (B) TYPE: nucleic acid (C) STRANDEDNESS: double
 - (D) TOPOLOGY: unknown
 - (ii) MOLECULE TYPE: cDNA

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:16:

GAATTCTGAG CACACAGGAC CTCACCATGG GATGGAGCTG TAT	TCATCCTC TTCTTGGTAG 60
CAACAGCTAC AGGTGTCCAC TCCCAGTCTG TGTTGACGCA GCC	CGCCCTCA GTCTCTGCGG 120
CCCCAGGACA GAAGGTCACC ATCTCCTGCA CTGGGAGCAG CTC	CCAACCTC GGGGCAGGTT 180
ATGATGTTCA CTGGTACCGG CAACTTCCAG GGACAGCCCC CAA	AACTCCTC ATCTATGATA 240
ACAACAATCG GCCCTCAGGG GTCCCTGACC GATTCTCTGG CTC	CCAAGTCT GGCCCCTCAG 300
CCTCCCTGGC CATCTCTGGG CTCCAGGCTG AGGATGAGGC TGA	ATTATTAC TGCCAGTCCT 360
ATGACAGCAG CCTGAATGGT TATGTCTTCG GAACTGGGAC CCA	AGCTCACC GTCCTAGGTC 420
AGCCCAAGGC TGCCCCCTCG GTCACTCTGT TCCCGCCCTC CTC	CTGAGGAG CTTCAAGCCA 480
ACAAGGCCAC ACTGGTGTGT CTCATAAGTG ACTTCTACCC GGG	GAGCCGTG ACAGTGGCCT 540
GGAAGGCAAT TAGCAGCCCC GTCAAGGCGG GAGTGGAGAC CAC	CCACACCC TCCAAACAAA 600
GCAACAACAA GTACGCGGCC AGCAGCTATC TGAGCCTGAC GCC	CTGAGCAG TGGAAGTCCC 660
ACAGAAGGTA CAGCTGCCAG GTCACGCATG AAGGGAGCAC CGT	TGGAGAAG ACAGTGGCCC 720
CTACAGAATG TTCATAGTTC TAGATCTACG TATGATCAGC CT	762

- (2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:17:
 - (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 6 amino acids
 (B) TYPE: amino acid
 (C) STRANDEDNESS:
 (D) TOPOLOGY: linear
 - (ii) MOLECULE TYPE: peptide
 - (xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:17:
 - Glu Val Gln Leu Leu Glu
- (2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:18:

(i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:(A) LENGTH: 6 amino acids(B) TYPE: amino acid(C) STRANDEDNESS:(D) TOPOLOGY: linear												
(ii) MOLECULE TYPE: peptide												
(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:18:												
Glu Val Gln Leu Val Glu 1 5												
(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:19:												
(i) SEQUENCE CHARACTERISTICS: (A) LENGTH: 1899 base pairs (B) TYPE: nucleic acid (C) STRANDEDNESS: double (D) TOPOLOGY: unknown												
(ii) MOLECULE TYPE: cDNA												
(ix) FEATURE: (A) NAME/KEY: CDS (B) LOCATION: 141735												
(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:19:												
(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:19: GGGGCAAATA ACA ATG GAG TTG CTA ATC CTC AAA GCA AAT GCA ATT ACC Met Glu Leu Leu Ile Leu Lys Ala Asn Ala Ile Thr 1 5 10	49											
GGGGCAAATA ACA ATG GAG TTG CTA ATC CTC AAA GCA AAT GCA ATT ACC Met Glu Leu Leu Ile Leu Lys Ala Asn Ala Ile Thr	49 97											
GGGGCAAATA ACA ATG GAG TTG CTA ATC CTC AAA GCA AAT GCA ATT ACC Met Glu Leu Leu Ile Leu Lys Ala Asn Ala Ile Thr 1 5 10 ACA ATC CTC ACT GCA GTC ACA TTT TGT TTT GCT TCT GGT CAA AAC ATC Thr Ile Leu Thr Ala Val Thr Phe Cys Phe Ala Ser Gly Gln Asn Ile												
GGGGCAAATA ACA ATG GAG TTG CTA ATC CTC AAA GCA AAT GCA ATT ACC Met Glu Leu Leu Ile Leu Lys Ala Asn Ala Ile Thr 1 5 10 ACA ATC CTC ACT GCA GTC ACA TTT TGT TTT GCT TCT GGT CAA AAC ATC Thr Ile Leu Thr Ala Val Thr Phe Cys Phe Ala Ser Gly Gln Asn Ile 15 20 25 ACT GAA GAA TTT TAT CAA TCA ACA TGC AGT GCA GTT AGC AAA GGC TAT Thr Glu Glu Phe Tyr Gln Ser Thr Cys Ser Ala Val Ser Lys Gly Tyr	97											
GGGGCAAATA ACA ATG GAG TTG CTA ATC CTC AAA GCA AAT GCA ATT ACC Met Glu Leu Leu Ile Leu Lys Ala Asn Ala Ile Thr 1 5 10 ACA ATC CTC ACT GCA GTC ACA TTT TGT TTT GCT TCT GGT CAA AAC ATC Thr Ile Leu Thr Ala Val Thr Phe Cys Phe Ala Ser Gly Gln Asn Ile 15 20 25 ACT GAA GAA TTT TAT CAA TCA ACA TGC AGT GCA GTT AGC AAA GGC TAT Thr Glu Glu Phe Tyr Gln Ser Thr Cys Ser Ala Val Ser Lys Gly Tyr 30 35 40 CTT AGT GCT CTG AGA ACT GGT TGG TAT ACC AGT GTT ATA ACT ATA GAA Leu Ser Ala Leu Arg Thr Gly Trp Tyr Thr Ser Val Ile Thr Ile Glu	97 145											
GGGGCAAATA ACA ATG GAG TTG CTA ATC CTC AAA GCA AAT GCA ATT ACC Met Glu Leu Leu Ile Leu Lys Ala Asn Ala Ile Thr 1 5 10 ACA ATC CTC ACT GCA GTC ACA TTT TGT TTT GCT TCT GGT CAA AAC ATC Thr Ile Leu Thr Ala Val Thr Phe Cys Phe Ala Ser Gly Gln Asn Ile 15 20 25 ACT GAA GAA TTT TAT CAA TCA ACA TGC AGT GCA GTT AGC AAA GGC TAT Thr Glu Glu Phe Tyr Gln Ser Thr Cys Ser Ala Val Ser Lys Gly Tyr 30 35 40 CTT AGT GCT CTG AGA ACT GGT TGG TAT ACC AGT GTT ATA ACT ATA GAA Leu Ser Ala Leu Arg Thr Gly Trp Tyr Thr Ser Val Ile Thr Ile Glu 45 50 55 60 TTA AGT AAT ATC AAG GAA AAT AAG TGT AAT GGA ACA GAT GCT AAG GTA Leu Ser Asn Ile Lys Glu Asn Lys Cys Asn Gly Thr Asp Ala Lys Val	97 145 193											

															AAA Lys	385	
	Asn										AGA Arg					433	
					Ser						GTT Val					481	
											AAA Lys					529	
											GGA Gly					577	
											GAT Asp 200					625	
											AAT Asn					673	
											GAG Glu					721	
-											AGC Ser					769	
											ATG Met					817	
											ATA Ile 280					865	
											GTC Val					913	
Val	Gln	Leu	Pro	Leu 305	Tyr	Gly	Val	Ile	Asp 310	Thr	CCC Pro	Cys	Trp	Lys 315	Leu	961	
											GAA Glu					1009	
Cys	Leu	Thr 335	Arg	Thr	Asp	Arg	Gly 340	Trp	Tyr	Сув	GAC Asp	Asn 345	Ala	Gly	Ser	1057	
GTA Val	TCT Ser 350	TTC Phe	TTC Phe	CCA Pro	CAA Gln	GCT Ala 355	GAA Glu	ACA Thr	TGT Cys	AAA Lys	GTT Val 360	CAA Gln	TCA Ser	AAT Asn	CGA Arg	1105	

	Phe					AAC Asn					Pro					1153
						TTC Phe										1201
						AGC Ser										1249
						AAA Lys										1297
						TTT Phe 435										1345
	Gly					TCT Ser										1393
						CTC Leu										1441
						TTC Phe										1489
						ATT Ile										1537
						AAT Asn 515										1585
						ATT Ile										1633
						CTC Leu										1681
						CAA Gln										1729
AGT Ser		TAAA	TAAA	r aa.	'AGCA	CCTA	A TC	ATGI	TCTI	' ACA	ATGG	TTT	ACTA	TCTG	SCT	1785
CATA	GACA	AC C	CATC	TGTC	TT A	GGAT	TTTC	TTA	TAAA.	CTG	AACT	TCAT	CG A	AACT	CTCAT	1845
CTAT	AAAC	TATAAACCA TCTCACTTAC ACTATTTAAG TAGATTCCTA GTTTATAGTT ATAT													1899	

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:20:

- (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 574 amino acids
 - (B) TYPE: amino acid
 - (D) TOPOLOGY: linear
- (ii) MOLECULE TYPE: protein
- (xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:20:
- Met Glu Leu Leu Ile Leu Lys Ala Asn Ala Ile Thr Thr Ile Leu Thr 1 5 10 15
- Ala Val Thr Phe Cys Phe Ala Ser Gly Gln Asn Ile Thr Glu Glu Phe 20 30
- Tyr Gln Ser Thr Cys Ser Ala Val Ser Lys Gly Tyr Leu Ser Ala Leu 35 40 45
- Arg Thr Gly Trp Tyr Thr Ser Val Ile Thr Ile Glu Leu Ser Asn Ile 50 60
- Lys Glu Asn Lys Cys Asn Gly Thr Asp Ala Lys Val Lys Leu Ile Lys 65 70 75 80
- Gln Glu Leu Asp Lys Tyr Lys Asn Ala Val Thr Glu Leu Gln Leu Leu 85 90 95
- Met Gln Ser Thr Pro Pro Thr Asn Asn Arg Ala Arg Arg Glu Leu Pro 100 105 110
- Arg Phe Met Asn Tyr Thr Leu Asn Asn Ala Lys Lys Thr Asn Val Thr 115 \$120\$
- Gly Ser Ala Ile Ala Ser Gly Val Ala Val Ser Lys Val Leu His Leu 145 150 150 155 160
- Glu Gly Glu Val Asn Lys Ile Lys Ser Ala Leu Leu Ser Thr Asn Lys 165 170 175
- Ala Val Val Ser Leu Ser Asn Gly Val Ser Val Leu Thr Ser Lys Val
- Leu Asp Leu Lys Asn Tyr Ile Asp Lys Gln Leu Leu Pro Ile Val Asn 195 200 205
- Lys Gln Ser Cys Ser Ile Ser Asn Ile Glu Thr Val Ile Glu Phe Gln 210 215 220
- Gln Lys Asn Asn Arg Leu Leu Glu Ile Thr Arg Glu Phe Ser Val Asn 225 230 235 240
- Leu Leu Ser Leu Ile Asn Asp Met Pro Ile Thr Asn Asp Gln Lys Lys 260 265 270
- Leu Met Ser Asn Asn Val Gln Ile Val Arg Gln Gln Ser Tyr Ser Ile 275 280 285

- Met Ser Ile Ile Lys Glu Glu Val Leu Ala Tyr Val Val Gln Leu Pro 290 295 300
- Leu Tyr Gly Val Ile Asp Thr Pro Cys Trp Lys Leu His Thr Ser Pro 305 310 315 320
- Leu Cys Thr Thr Asn Thr Lys Glu Gly Ser Asn Ile Cys Leu Thr Arg 325 330 335
- Thr Asp Arg Gly Trp Tyr Cys Asp Asn Ala Gly Ser Val Ser Phe Phe 340 345 350
- Pro Gln Ala Glu Thr Cys Lys Val Gln Ser Asn Arg Val Phe Cys Asp \$355\$
- Thr Met Asn Ser Leu Thr Leu Pro Ser Glu Ile Asn Leu Cys Asn Val 370 375 380
- Asp Ile Phe Asn Pro Lys Tyr Asp Cys Lys Ile Met Thr Ser Lys Thr 385 390 395 400
- Asp Val Ser Ser Ser Val Ile Thr Ser Leu Gly Ala Ile Val Ser Cys 405 410 415
- Tyr Gly Lys Thr Lys Cys Thr Ala Ser Asn Lys Asn Arg Gly Ile Ile 420 425 430
- Lys Thr Phe Ser Asn Gly Cys Asp Tyr Val Ser Asn Lys Gly Met Asp 445
- Thr Val Ser Val Gly Asn Thr Leu Tyr Tyr Val Asn Lys Gln Glu Gly 450 455 460
- Lys Ser Leu Tyr Val Lys Gly Glu Pro Ile Ile Asn Phe Tyr Asp Pro 465 470 475 480
- Leu Val Phe Pro Ser Asp Glu Phe Asp Ala Ser Ile Ser Gln Val Asn 485 490 495
- Glu Lys Ile Asn Gln Ser Leu Ala Phe Ile Arg Lys Ser Asp Glu Leu 500 505 510
- Leu His Asn Val Asn Ala Gly Lys Ser Thr Thr Asn Ile Met Ile Thr 515 520 525
- Thr Ile Ile Val Ile Ile Val Ile Leu Leu Ser Leu Ile Ala Val 530 535 540
- Gly Leu Leu Tyr Cys Lys Ala Arg Ser Thr Pro Val Thr Leu Ser 545 550 555 560
- Lys Asp Gln Leu Ser Gly Ile Asn Asn Ile Ala Phe Ser Asn 565 570
- (2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:21:
 - (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 15 amino acids
 - (B) TYPE: amino acid
 - (C) STRANDEDNESS:
 - (D) TOPOLOGY: unknown

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:21:

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Gly Gly Gly Gly Ser I 5 10 15

【図面の簡単な説明】

- 【図1A】 $G\lambda-1$ s c F V ファージ結合のR S V 19 m A b (国際特許出願公報第WO 92/04381 号、1992 年 3 月 19 日公開)との競合を示すグラフである。
- 【図1B】 G λ -1 s c F V ファージ結合のR S V B 4 m A b (国際特許出願公報第WO 9 3 / 2 0 2 1 0 号、1 9 9 3 年 1 0 月 1 4 日公開)との競合を示すグラフである。
- 【図2】 $scFVファージ、G\lambda-1、G\lambda-3およびG\kappa-1とRSV$ 系統273によるウイルス中和を示すグラフである。
- 【図3】 $G\lambda-1$ L鎖可変領域、プロセッシングされたN末端から枠組み構造 IVODNA配列(配列番号1)および蛋白質配列(一文字コードにおいて報告されたアミノ酸)(配列番号2)を示す。
- 【図4】 $G\lambda-1$ H鎖可変領域、プロセッシングされたN末端から枠組み構造 IVODNA配列(配列番号3)および蛋白質配列(一文字コードにおいて報告されたアミノ酸)(配列番号4)を示す。
- 【図5】 $G\lambda-1$ モノクローナル抗体の構築に使用されるクローニング法を示す。H鎖V領域をpCD誘導体ベクター中にXhoI-ApaIフラグメントとしてクローン化した。全L鎖V領域をpCN誘導体ベクター、43-1pcn中にSacI-AvrIIフラグメントとしてクローン化した。詳細は上記する。
- 【図 6 】 $G\lambda-1$ 一本鎖Fv のH鎖T ミノ酸配列(配列番号 5)と本発明 の種々のモノクローナル抗体との比較を提供する。A(配列番号 7)およびB (配列番号 8)構築物のH鎖のアミノ酸配列を示す。残基の番号は、生殖細胞系(

GL)遺伝子Dp58(配列番号6)に基づき、成熟のプロセッシングされたアミノ末端で開始し、CDR3で終結する。「一」は上記の配列との同一性を示す(例えば、Bと比べたA)。太字の残基はリーダー領域およびCDR1-3に相当する。

【図7】 $G\lambda-1A1$ 本鎖FvのL鎖Tミノ酸配列(配列番号9)と本発明の種々のモノクローナル抗体の比較を提供する。A(配列番号11)およびB(配列番号12)構築物のL鎖Tミノ酸配列を示す。V κ 領域の残基の番号は、生殖細胞系(GL)遺伝子Dp L 8 (配列番号10)に基づき、成熟のプロセッシングされたTミノ末端で開始し、CD R 3 で終結する。枠組み構造4を参照するために、実際の番号付もまた $G\lambda-1$ Aについて示される。図6と同様に、「一」は上記の配列との同一性を示す。


【図8】 図8A~8Fは、H鎖についてRSV中和ヒトG λ -1mAbを含有する発現プラスミドG λ -1Apcdの連続的なDNA配列(配列番号13)を示す。G λ -1H鎖の翻訳開始、リーダーペプチド、アミノ末端プロセッシング部位、カルボキシ末端およびEcoRI制限エンドヌクレアーゼ切断部位を示す。

【図9】 図9A~9Eは、L鎖についてRSV中和ヒトG λ -1mAbを含有する発現プラスミドG λ -1Apcnの連続的なDNA配列(配列番号14)を示す。図8A-8Fと同様にL鎖について対応する特徴が示される。

【図10】 図10Aおよび10Bは、プラスミド $G\lambda$ -1BpcdのH鎖のコーディング領域の連続的なDNA配列(配列番号15)を示す。太字の残基は、図8A-8F(配列番号13)における $G\lambda$ -1Apcdのための全ベクター配列との相違を示す。

【図11】 プラスミド $G\lambda$ -1BpcnのL鎖のコーディング領域のDNA配列(配列番号16)を示す。太字の残基は、図9A-9E(配列番号14)における $G\lambda$ -1Apcnの全ベクター配列との相違を示す。

Fig. 1A RSV19/GI1 scFv ファージ競合



【図1B】

B4/GI1 scFv ファージ競合




Fig. 1B

Fig. 2 ファージF v を用いるRS/V/273の中和




FIGURE 3

50	TCTGTGTTGACGCAGCCGCCCTCAGTCTCTGCGGCCCCAGGACAGAA S V L T Q P P S V S A A P G Q K	1.
100	CACCATCTCCTGCACTGGGAGCAGCTCCAACCTCGGGGCAGGTTATG T I S C T G S S S N L G A G Y D	51
150	TTCACTGGTACCGGCAACTTCCAGGGACAGCCCCCAAACTCCTCATC HWYRQLPGTAPKLLI	101
200	GATAACAACAATCGGCCCTCAGGGGTCCCTGACCGATTCTCTGGCTC D N N N R P S G V P D R F S G S	151
250	GTCTGGCCCTCAGCCTCCCTGGCCATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGG S G P S A S L A I S G L Q A E D	201
300	AGGCTGATTATTACTGCCAGTCCTATGACAGCAGCCTGAATGGTTAT ADYYCQSYDSSLNGY	251
336	TTCGGAACTGGGACCCAGCTCACCGTCCTAGGT	301

FIGURE 4

50	GTC	GGG	IGG	CC'	CAG	AT:	TG	GC'I	AG	GG	TGC	GTC	GG	GG7	GCT	GCA	GGT	GA	1
	S	G	G	P	Q	Ţ.	, 7	I	G	G	G	S	Ε	V	L	Q	V	E	
100	AGA M		GAT. Y	TG(G	CAG S	CT L	TC(S	GTC V						CCI				CC L	. 51
150	TCC S	TCT' S			TAA W	GG E	GC:	GGG G	BAA K	.GG(G	CCA P			CGC R					101
200	CCG R	GGG(G	GAA K	V V				ACT S	YY	'ACI H	CAT I	TTA Y	TA? N	GAG S	TAT M	TGG G	TAC T	AT I	151
250		AAA' M		TC:			TC# S	AAC V						CC# F				AT F	201
300	CCG P	CAA(Q :			GTG A		TT'A Y	ΓΤΑ Υ	GT V	GG". G	ACC T	GAC D		GCC A			AGC(S		251
350	CGT V	CAC(T	GT V	CT(L				202 2	GG G	TTC W		TGA D	TTI F	GCC P			GGA(301
357																	CCT		351




FIGURE 6

G λ ー 1 一本鎖 f ν と m A b の H鎖アミノ酸配列の比較

リーダーおよび可変領域

GL Dp58: Gλ-1 scFv:		EVQLVESGGGLVQPGGSLRLS	
3λ-1 serv: Gλ-1A: Gλ-1B:		GVHSL	
	CDR1	CDR2	
	G-K	EWVS YISSSGSTIYYADSVKG RFT	M
		CDR3	
GL: Dp58: Gλ-1 scFv: Gλ-1A: Gλ-1B:		CAR T OPGELAPFDH WGQGTLVTVSS	

FIG 7 G λ − 1 A 一本鎖 F v と m A b の L 鎖アミノ酸配列の比較

リーダーおよび可変領域

		CDR1
GL DpL8:	ı	QSVLTQPPSVSGAPGQRVTISC TGSSSNIG
Gλ-1 scFv:		L-
Gλ-1A:	MGWSCIILFLVATATGVHS	E
Gλ-1B:		osv
		CDR2
GL DpL8:	AGYDVH WYQQLPGTAPKLL	IY GNSNRPS GVPDRFSGSKSGTSASLA IT GL
Gλ-1scFv:		D-N S
Gλ-1A:		
Gλ-1B:		
	CDR3	
GL DpL8:	QAEDEADYYC	
Gλ-1 scFv:	QSYDSSLNG	YV FGTGTQLTVLG
Gλ-1A:		
Gλ-1B:		

FIGURE 8A

1	gacgtcgcggccgctctaggcctccaaaaaagcctcctcactacttctgg
51	aatagctcagaggccgaggcgtctcggcctctgcataaataa
101	tagtcagccatgcatggggggagaatgggcggaactgggcggagttagg
151	ggcgggatgggcggagttaggggggggactatggttgctgactaattgag
201	atgcatgctttgcatacttctgcctgctggggagcctggggactttccac
251	acctggttgctgactaattgagatgcatgctttgcatacttctgcctgc
301	ggggagcctggggactttccacaccctaactgacacacattccacagaat
351	taattcccggggatcgatccgtcgacgtacgactagttattaatagtaat
401	caattacggggtcattagttcatagcccatatatggagttccgcgttaca
451	taacttacggtaaatggcccgcctggctgaccgcccaacgacccccgccc
501	attgacgtcaataatgacgtatgttcccatagtaacgccaatagggactt
551	tccattgacgtcaatgggtggactatttacggtaaactgcccacttggca
601	gtacatcaagtgtatcatatgccaagtacgccccctattgacgtcaatga
651	cggtaaatggcccgcctggcattatgcccagtacatgaccttatgggact
701	ttcctacttggcagtacatctacgtattagtcatcgctattaccatggtg
751	atgcggttttggcagtacatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacg
801	gggatttccaagtctccaccccattgacgtcaatgggagtttgttt
851	accaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaacaactccgccccattg
901	acgcaaatgggcggtaggcgtgtacggtgggaggtctatataagcagagc
951	EcoRI tgggtacgtgaaccgtcagatcgcctggagacgccatcgaattctgagca
1001	cacaggacctcaccatgggatggagctgtatcatcctcttcttggtagca
1001	M G W S C I I L F L V A リーダー 開始
	リーター 開始 XhoI
1051	acagetacaggtgtccactccgaggtccaactgctcgagtctgggggagg

プロセッシングされたN末端

FIGURE 8B

1101	cttggtacagcctggggggtccctgagactctcctgcgcagcctctggag
1151	tctccctcagtggatacaagatgaactgggtccgccaggctccagggaag
1201	gggctggaatgggtctcttccattactggtatgagtaattacataca
1251	ctcagactcagtgaagggccgattcaccatctccagagacaacgccatga
1301	actcactgtatctgcaaatgaacagcctgacagccgaggacacgggtgtt
1351	tattattgtgcgacacaaccgggggagctggcgccttttgaccattgggg
1401	BstEII Bsp120I ccagggaaccctggtcaccgtctcctcagcctccaccaagggcccatcgg Q G T L V T V S S / 枠組み構造 IV / CH1
1451	tcttccccctggcaccctcctccaagagcacctctgggggcacagcggcc
1501	ctgggctgcctggtcaaggactacttccccgaaccggtgacggtgtcgtg
1551	gaactcaggcgccctgaccagcggcgtgcacaccttcccggctgtcctac
	BstEII
1601	agtectcaggactctactccctcagcagcgtggtgaccgtgccctccagc
1651	agcttgggcacccagacctacatctgcaacgtgaatcacaagcccagcaa
1701	caccaaggtggacaagaagttgagcccaaatcttgtgacaaaactcaca
1751	catgcccaccgtgcccagcacctgaactcctggggggaccgtcagtcttc
1801	ctcttccccccaaaacccaaggacaccctcatgatctcccggacccctga
1851	ggtcacatgcgtggtggtggacgtgagccacgaagaccctgaggtcaagt
1901	tcaactggtacgtggacggcgtggaggtgcataatgccaagacaaagccg
1951	cgggaggagcagtacaacagcacgtaccgggtggtcagcgtcctcaccgt
2001	cctgcaccaggactggctgaatggcaaggagtacaagtgcaaggtctcca
2051	acaaagccctcccagcccccatcgagaaaaccatctccaaagccaaaggg
2101	cageceegagaaceacaggtgtacaceetgeeeecateeegggatgaget
2151	gaccaagaaccaggtcagcctgacctgcctggtcaaaggcttctatccca

FIGURE 8C

2201	gcgacatcgccgtggagtgggagagcaatgggcagccggagaacaactac
2251	aagaccacgcctcccgtgctggactccgacggctccttcttcctctacag
2301	caagctcaccgtggacaagagcaggtggcagcaggggaacgtcttctcat
2351	gctccgtgatgcatgaggctctgcacaaccactacacgcagaagagcctc
2401	tccctgtctccgggtaaa <u>tga</u> tagatatctacgtatgatcagcctcgact S P G K * H鎖のC末端
2451	gtgccttctagttgccagccatctgttgtttgcccctcccccgtgccttc
2501	cttgaccctggaaggtgccactcccactgtcctttcctaataaaatgagg
2551	aaattgcatcgcattgtctgagtaggtgtcattctattctggggggtggg
2601	gtggggcaggacagcaagggggaggattgggaagacaatagcaggcatgc
2651	tggggatgcggtgggctctatggaaccagctggggctcgacagcgctgga
2701	tetecegatececagetttgetteteaatttettatttgeataatgagaa
2751	aaaaaggaaaattaattttaacaccaattcagtagttgattga
2801	cgttgccaaaaaggatgctttagagacagtgttctctgcacagataagga
2851	caaacattattcagagggagtacccagagctgagactcctaagccagtga
2901	gtggcacagcattctagggagaaatatgcttgtcatcaccgaagcctgat
2951	tccgtagagccacaccttggtaagggccaatctgctcacacaggatagag
3001	agggcaggagccagggcagagcatataaggtgaggtaggatcagttgctc
3051	ctcacatttgcttctgacatagttgtgttgggagcttggatagcttggac
3101	agctcagggctgcgatttcgcgccaaacttgacggcaatcctagcgtgaa
3151	ggctggtaggattttatccccgctgccatcatggttcgaccattgaactg
3201	catcgtcgccgtgtcccaaaatatggggattggcaagaacggagacctac
3251	cctggcctccgctcaggaacgagttcaagtacttccaaagaatgaccaca
3301	acctcttcagtggaaggtaaacagaatctggtgattatgggtaggaaaac
3351	ctggttctccattcctgagaagaatcgacctttaaaggacagaattaata

FIGURE 8D

tagttctcagtagagaactcaaagaaccaccacgaggagctcattttc	tt
gccaaaagtttggatgatgccttaagacttattgaacaaccggaattg	gc
aagtaaagtagacatggtttggatagteggaggcagttetgtttacca	gg
aagccatgaatcaaccaggccaccttagactctttgtgacaaggatca	t.g
caggaatttgaaagtgacacgtttttcccagaaattgatttggggaaa	ta
taaactteteecagaataeceaggegteetetetgaggteeaggagga	aa
aaggcatcaagtataagtttgaagtctacgagaagaaaga	aa
gatgctttcaagttctctgctcccctcctaaagctatgcatttttata	ag
accatgggacttttgctggctttagatcagcctcgactgtgccttctag	gt
tgccagccatetgttgtttgcccctccccgtgccttccttgaccctg	уa
aggtgccactcccactgtcctttcctaataaaatgaggaaattgcatc	gc
attgtctgagtaggtgtcattctattctggggggtggggtggggcagg	ąс
agcaaggggggggattgggaagacaatagcaggcatgctggggatgcg	gt
gggctctatggaaccagctggggctcgatcgagtgtatgactgcggccg	ЗС
gatcccgtcgagagcttggcgtaatcatggtcatagctgtttcctgtg	-g
aaattgttatoogotoacaattooacacaacataogagooggaagoata	зa
agtgtaaageetggggtgeetaatgagtgagetaacteacattaattg	g
ttgcgctcactgcccgctttccagtcgggaaacctgtcgtgccagctg	a
ttaatgaatcggccaacgcgcggggagaggcggtttgcgtattgggcg	it
cttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcg	19
cgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaat	:C
aggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaaggccagcaaaaggcc	a:
ggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcc	C
cctgacgagcatcacaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacc	:c
gacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtg	rc

FIGURE 8E

geteteetgtteegaeeetgeegettaeeggataeetgteegeetttete
ccttcgggaagcgtggcgctttctcaatgctcacgctgtaggtatctcag
tteggtgtaggtegttegeteeaagetgggetgtgtgeaegaaceeeeeg
ttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaac
ccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggat
tagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggc
ctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctg
aagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaaca
aaccaccgctggtagcggtggttttttttgtttgcaagcagcagattacgc
gcagaaaaaaaggatetcaagaagateettttgatettttetaeggggtet
gacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggatttttggtcatgagatt
atcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagtttta
aatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttaccaatge
ttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccat
agttgectgactecccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttac
catctggccceagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggct
ccagatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaag
tggtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaattgttgccggg
aagetagagtaagtagttegeeagttaatagtttgegeaaegttgttgee
attgctacaggcatcgtggtgtcacgctcgtcgtttggtatggcttcatt
cagctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccccatgttgt
gcaaaaaagcggttagctccttcggtcctccgatcgttgtcagaagtaag
ttggccgcagtgttatcactcatggttatggcagcactgcataattctct
tactgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtactcaa

FIGURE 8F

5851	ccaagtcattctgagaatagtgtatgcggcgaccgagttgctcttgcccg
5901	gcgtcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaaagtgct
5951	cateattggaaaaegttetteggggegaaaaeteteaaggatettaeege
6001	tgttgagatccagttcgatgtaacccactcgtgcacccaactgatcttca
6051	gcatcttttactttcaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggca
6101	aaatgccgcaaaaaagggaataagggcgacacggaaatgttgaatactca
6151	tactcttcctttttcaatattattgaagcatttatcagggttattgtctc
6201	atgagoggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggggt
6251	teegegeacattteecegaaaagtgeeacet

FIGURE 9A

1	gacgtcgcggccgctctaggcctccaaaaaagcctcctcactacttctgg
51	aatagctcagaggccgaggcgtctcggcctctgcataaataa
101	tagtcagccatgcatggggggggagaatgggcggaactgggcggagttagg
151	ggcgggatgggcggagttaggggggggactatggttgctgactaattgag
201	atgcatgctttgcatacttctgcctgctggggagcctggggactttccac
251	acctggttgctgactaattgagatgcatgctttgcatacttctgcctgc
301	ggggagcctggggactttccacaccctaactgacacacattccacagaat
351	taattcccggggatcgatccgtcgacgtacgactagttattaatagtaat
401	caattacggggtcattagttcatagcccatatatggagttccgcgttaca
451	taacttacggtaaatggcccgcctggctgaccgcccaacgacccccgccc
501	attgacgtcaataatgacgtatgttcccatagtaacgccaatagggactt
551	tccattgacgtcaatgggtggactatttacggtaaactgcccacttggca
601	gtacatcaagtgtatcatatgccaagtacgcccctattgacgtcaatga
651	cggtaaatggcccgcctggcattatgcccagtacatgaccttatgggact
701	ttcctacttggcagtacatctacgtattagtcatcgctattaccatggtg
751	atgcggttttggcagtacatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacg
801	gggatttccaagtctccaccccattgacgtcaatgggagtttgttt
851	accaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaacaactccgccccattg
901	acgcaaatgggcggtaggcgtgtacggtgggaggtctatataagcagagc
951	EcoRI tgggtacgtgaaccgtcagatcgcctggagacgccatcgaattctgagca
1001	cacaggacctcacc <u>atg</u> ggatggagctgtatcatcctcttcttggtagca M G W S C I I L F L V Aリーダー 開始
	SacI
1051	acagetacaggtgtccactccgagetcacgcagecgccctcagtctctgc T A T G V H S E L T Q

_____ プロセッシングされたN末端

FIGURE 9B

1101	ggccccaggacagaaggtcaccatctcctgcactgggagcagctccaacc
1151	tcggggcaggttatgatgttcactggtaccggcaacttccagggacagcc
1201	cccaaactcctcatctatgataacaacaatcggccctcaggggtccctga
1251	ccgattctctggctccaagtctggcccctcagcctccctggccatctctg
1301	ggctccaggctgaggatgaggctgattattactgccagtcctatgacagc
1 351	AvrII agcctgaatggttatgtcttcggaactgggacccagctcaccgt $cctagg$ T Q L T V L G 枠組み構造 IV / CA
1401	tcagcccaaggctgccccctcggtcactctgttcccgccctcctctgagg
1451	agcttcaagccaacaaggccacactggtgtgtctcataagtgacttctac
1501	ccgggagccgtgacagtggcctggaaggcaattagcagccccgtcaaggc
1551	gggagtggagaccaccacaccctccaaacaaagcaacaacaagtacgcgg
1601	ccagcagctatctgagcctgacgcctgagcagtggaagtcccacagaagg
1651	tacagctgccaggtcacgcatgaagggagcaccgtggagaagacagtggc
1701	ccctacagaatgttca <u>tag</u> ttctagatctacgtatgatcagcctcgactg P T E C S * C末端 L鎖
1751	tgccttctagttgccagccatctgttgtttgcccctcccccgtgccttcc
1801	ttgaccctggaaggtgccactcccactgtcctttcctaataaaatgagga
1851	aattgcatcgcattgtctgagtaggtgtcattctattct
1901	tggggcaggacagcaagggggggggttgggaagacaatagcaggcatgct
1951	ggggatgcggtgggctctatggaaccagctggggctcgacagctcgagct
2001	agctttgcttctcaatttcttatttgcataatgagaaaaaaaggaaaatt
2051	aattttaacaccaattcagtagttgattgagcaaatgcgttgccaaaaag
2101	gatgctttagagacagtgttctctgcacagataaggacaaacattattca
2151	gagggagtacccagagctgagactcctaagccagtgagtg

FIGURE 9C

ctagggagaaatatgettgtcatcaccgaagcctgattccgtagagccac
accttggtaagggccaatctgctcacacaggatagaggggcaggagcca
gggcagagcatataaggtgaggtaggatcagttgctcctcacatttgctt
ctgacatagttgtgttgggagettggategatecaccatggttgaacaag
atggattgcacgcaggttctccggccgcttgggtggagaggctattcggc
tatgactgggcacaacagacaatcggctgctctgatgccgcgtgttccg
gctgtcagcgcaggggcgcccggttctttttgtcaagaccgacc
gtgccctgaatgaactgcaggacgaggcagcgggctatcgtggctggc
acgacgggcgttccttgcgcagctgtgctcgacgttgtcactgaagcggg
aagggactggctgctattgggcgaagtgccggggcaggatctcctgtcat
ctcaccttgctcctgccgagaaagtatccatcatggctgatgcaatgcgg
cggctgcatacgcttgatccggctacctgcccattcgaccaccaagcgaa
acatcgcatcgagcgagcacgtactcggatggaagccggtcttgtcgatc
aggatgatctggacgaagagcatcaggggctcgcgccagccgaactgttc
gccaggctcaaggcgcgcatgcccgacggcgaggatctcgtcgtgaccca
tggcgatgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggccgcttttctg
gattcatcgactgtggccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacata
gcgttggctacccgtgatattgctgaagagcttggcggcgaatgggctga
cegettectegtgetttaeggtategeegeteeegattegeagegeateg
ccttctatcgccttcttgacgagttcttctgagcgggactctggggttcg
aaatgaccgaccaagcgacgcccaacctgccatcacgagatttcgattcc
accgccgccttctatgaaaggttgggcttcggaatcgttttccgggacgc
cggctggatgatectecagegeggggateteatgetggagttettegeee
accccaacttgtttattgcagcttataatggttacaaataaagcaatagc

FIGURE 9D

3401	atcacaaatttcacaaataaagcatttttttcactgcattctagttgtgg
3451	tttgtccaaactcatcaatgtatcttatcatgtctggatcgcggccgcga
3501	tcccgtcgagagcttggcgtaatcatggtcatagctgtttcctgtgtgaa
3551	attgttatccgctcacaattccacacaacatacgagccggaagcataaag
3601	tgtaaagcctggggtgcctaatgagtgagctaactcacattaattgcgtt
3651	gegeteactgecegetttecagtegggaaacetgtegtgecagetgeatt
3701	aatgaatcggccaacgcgcggggagaggcggtttgcgtattgggcgctct
3751	tecgettectegeteactgactegetgegeteggtegtteggetgeggeg
3801	ageggtateageteacteaaaggeggtaataeggttateeacagaateag
3851	gggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccagg
3901	aaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgccccc
3951	tgacgagcatcacaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccga
4001	caggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgc
4051	teteetgtteegaceetgeegettaeeggataeetgteegeettteteee
4101	ttcgggaagcgtggcgctttctcaatgctcacgctgtaggtatctcagtt
4151	cggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgtt
4201	cagecegacegetgegeettateeggtaactategtettgagtecaacee
4251	ggtaagacacgacttatcgccactggcagccactggtaacaggatta
4301	gcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcct
4351	aactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctgaa
4401	gccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaa
4451	${\tt Ccaccgctggtagcggtggttttttttgtttgcaagcagcagattacgcgc}$
4501	agaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctga
4551	cgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattat

FIGURE 9E

4601	caaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagttttaaa
4651	tcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttaccaatgctt
4701	aatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatag
4751	ttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttacca
4801	tetggececagtgetgeaatgatacegegagacecaegeteaeeggetee
4851	agatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtg
4901	gtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaattgttgccgggaa
4951	${\tt gctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgccat}$
5001	${\tt tgctacaggcatcgtggtgtcacgctcgtcgtttggtatggcttcattea}$
5051	${\tt gctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccccatgttgtgc}$
5101	aaaaaageggttageteetteggteeteegategttgteagaagtaagt
5151	ggccgcagtgttatcactcatggttatggcagcactgcataattctctta
5201	$\verb ctgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtactcaacc \\$
5251	a agt cattet gaga a tag t g tat g c g g c g acc g agt t g c tet t g c c c g g c
5301	gtcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaaagtgctca
5351	teattggaaaacgttetteggggegaaaacteteaaggatettacegetg
5401	${\tt ttgagatccagttcgatgtaacccactcgtgcacccaactgatcttcagc}$
5451	atettttaettteaccagegtttetgggtgageaaaaacaggaaggeaaa
5501	atgccgcaaaaaagggaataagggcgacacggaaatgttgaatactcata
5551	$\verb ctcttcctttttcaatattattgaagcatttatcagggttattgtctcat \\$
5601	gagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggggttc
5651	cgcgcacatttccccgaaaagtgccacct

FIGURE 10A ECORI gaattetgagea	1000
cacaggacctcaccatgggatggagctgtatcatcctcttcttggtagca M G W S C I I L F L V A	1050
acagctacaggtgtccactccgaggt \mathbf{g} ca \mathbf{g} ctg \mathbf{g} t \mathbf{g} gagtctgggggagg T A T G V H S \mathbf{E} V Q L \mathbf{v} E S - N- 末端	1100
cttggtacagcctggggggtccctgagactctcctgcgcagcctctggag	1150
tctccctcagtggatacaagatgaactgggtccgccaggctccagggaag	1200
gggctggaatgggtctcttccattactggtatgagtaattacataca	1250
ctcagactcagtgaagggccgattcaccatctccagagacaacgccatga	1300
actcactgtatctgcaaatgaacagcctgacagccgaggacacgggtgtt	1350
tattattgtgcgacacaaccgggggagctggcgccttttgaccattgggg	1400
Bsp120I ccagggaaccctggtcaccgtctcctcagcctccaccaagggcccatcgg	1450
tettecccetggcaccetectccaagagcacctetgggggcacagcggce	1500
ctgggctgcctggtcaaggactacttccccgaaccggtgacggtgtcgtg	1550
gaactcaggcgccctgaccagcggcgtgcacaccttcccggctgtcctac	1600
agtectcaggactctactccctcagcagcgtggtgaccgtgccctccagc	1650
agcttgggcacccagacctacatctgcaacgtgaatcacaagcccagcaa	1700
caccaaggtggacaagaagttgagcccaaatcttgtgacaaaactcaca	1750
catgcccaccgtgcccagcacctgaactcctggggggaccgtcagtcttc	1800
ctcttccccccaaaacccaaggacaccctcatgatctcccggacccctga	1850
ggtcacatgcgtggtggtggacgtgagccacgaagaccctgaggtcaagt	1900
tcaactggtacgtggacggcgtggaggtgcataatgccaagacaaagccg	1950
cgggaggagcagtacaacagcacgtaccgggtggtcagcgtcctcaccgt	2000
cctgcaccaggactggctgaatggcaaggagtacaagtgcaaggtctcca	2050

FIGURE 10B

acaaagccctcccageccccategagaaaaccatetccaaagccaaaggg	2100
cageceegagaaceaeaggtgtacaceetgeeeecateeegggatgaget	2150
gaccaagaaccaggteageetgacetgeetggteaaaggettetateeca	2200
gcgacatcgccgtggagtgggagagcaatgggcagccggagaacaactac	2250
aagaccacgcctcccgtgetggactccgacggctccttcttcctctacag	2300
caageteaeegtggacaagagcaggtggcagcaggggaaegtetteteat	2350
gctccgtgatgcatgaggctctgcacaaccactacacgcagaagagcctc	2400
tccctgtctccgggtaaa <u>tga</u> tagatatct S P G K *	

EcoRI <u>gaattc</u> tgagca	1000
cacaggacctcacc <u>atg</u> ggatggagctgtatcatcctcttcttggtagca M G W S C I I L F L V A	1050
acagctacaggtgtccactcc $cagtct$ g t g t g t gacgcagccgccctcagt T A T G V H S Q S V L T Q - N- 末端	1100
ctctgcggccccaggacagaaggtcaccatctcctgcactgggagcagct	1150
ccaacctcggggcaggttatgatgttcactggtaccggcaacttccaggg	1200
acagececcaaacteeteatetatgataacaacaateggeeeteaggggt	1250
ccctgaccgattctctggctccaagtctggcccctcagcctccctggcca	1300
tctctgggctccaggctgaggatgaggctgattattactgccagtcctat	1350
gacagcagcctgaatggttatgtcttcggaactgggacccagctcaccgt	1400
AvrII <pre>cctaggtcagcccaaggctgccccctcggtcactctgttcccgccctcct</pre>	1450
ctgaggagcttcaagccaacaaggccacactggtgtgtctcataagtgac	1500
ttctacccgggagccgtgacagtggcctggaaggcaattagcagcccgt	1550
caaggcgggagtggagaccaccacaccctccaaacaaagcaacaagt	1600
acgcggccagcagctatctgagcctgacgcctgagcagtggaagtcccac	1650
agaaggtacagctgccaggtcacgcatgaagggagcaccgtggagaagac	1700
agtggcccctacagaatgttca <u>tag</u> ttctagatctacgtatgatcagcct P T E C S *	1750

International application No. INTERNATIONAL SEARCH REPORT PCT/US00/13694 CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC(7) : A61K 39/395, 39/42; C12Q 1/00, 1/70; G01N 33/53 US CL : 424/130.1, 141.1, 147.1; 435/4, 5, 7.1 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) U.S.: 424/130.1, 141.1, 147.1; 435/4, 5, 7.1 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) Please See Extra Sheet. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Х US 5.81 ,524 A (BRAMS et al) 22 September 1998, cols. 12-20. 1, 4, 10-15 Y 2, 3 US 5,824,307 A (JOHNSON) 20 October 1998, cols. 4-6. 1, 4, 10-15 X Y 2, 3 1, 4, 10-15 X US 5,880,104 A (LI et al) 09 March 1999, cols. 6-10. 2, 3 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention Special categories of cited documents: 'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken slone earlier document published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority clasin(s) or which it cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) ·L· document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other ٠0٠ document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 05 SEP 2000 16 AUGUST 2000 Name and mailing address of the ISA/US Commissioner of Patents and Trademarks Box PCT Authorized officer BRETT NELSON Washington, D.C. 20231 Telephone No. (703) 358-1235 Facsimile No. (703) 305-3230

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)*

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/US00/13694

B. FIELDS SEARCHED Electronic data bases consulted (Name of data base and where practicable terms used):
WEST, DIALOG, MEDLINE search terms: RSV, respiratory syncytial, monoclonal, antibodies, human, humanized, F protein, diagnostics, passive immunization, therapy, treatment

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 1998)*

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷		識別記号	FΙ		テーマコート	' (参考)
C07K	16/10		C 1 2 N	1/15		
C12N	1/15			1/19		
	1/19			1/21		
	1/21		C 1 2 P	21/08		
	5/10		G 0 1 N	33/53	D	
C 1 2 P	21/08			33/569	L	
G01N	33/53			33/577	В	
	33/569		C 1 2 N	15/00	ZNAA	
	33/577			5/00	A	

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AL, AU, BA, BB, BG, BR, CA, CN, CZ, DZ, EE, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KP, KR, LC, LK, LR, LT, LV, MA, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, SL, TR, TT, TZ, UA, US, UZ, VN, YU, ZA

(72)発明者 レイモンド・ダブリュー・スウィート アメリカ合衆国19004ペンシルベニア州バ ラ・シンウィド、エッジヒル・ロード108 番

(72) 発明者 ジェラルディーン・テイラー イギリス、アールジー20・7エヌエヌ、バ ークシャー、ニューベリー、コンプトン

F ターム(参考) 4B024 AA01 AA14 BA41 CA04 DA02 EA02 EA04 FA02 GA11 HA01 HA11 HA15

4B064 AG27 CA10 CA19 CC24 DA01 DA15

4B065 AA90X AA97Y AB01 BA02 CA25 CA45 CA46

4C085 AA14 BA57 CC07 CC08 DD23 4H045 AA11 AA30 BA10 CA01 DA76 EA31 EA53 FA74